

化学療法計画書

治療法名	EDP (ETOP/DXR/CDDP)				
コース数	1	コース目			
腫瘍種	副腎がん				
患者名		性別	年齢		
患者ID	生年月日				
部署		主治医	科	Dr	

開始予定日		1	2	3	4	5	6	7	8	...	15	...	22	...	29	...
治療内容	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	...	15	...	22	...	29	...
	予定日	1/0							1/7	...	1/14	...	1/21	...	1/28	...
ドキシソルピシン	40 mg/m ²	↓													↓	
シスプラチン	40 mg/m ²		↓	↓											↓	
エトポシド	100 mg/m ²		↓	↓	↓										↓	↓
グラニセトロン	1mg	↓														
パロノセトロン	0.75mg			↓												
デキサート注	6.6mg		↓	↓	↓											
デキサート注	9.9mg				↓											
ホスアプレピタント	150mg				↓											
デカドロン	8mg					↓	↓	↓								
オランザピン	5mg			↓	↓	↓										
ジーラスタ	3.6mg					↓										
治療開始日									治療間隔	4週毎	予定コース数					コース
身長	150 cm	体重	50 kg	BSA	1.40 m ²											
eGFR	60 ml/min	eGFR/BSA	49 ml/min													

投与開始基準
<ul style="list-style-type: none"> ・WBC>3,000, かつ好中球>2,000 ・Plt>100,000 ・発熱なし ・PS 0-2 ・AST/ALT≤100, T-Bil≤1.5 ・Cr≤1.2

Day 1
1) グラニセトロン 1mg
デキサート 6.6mg 30分
↓
2) 生理食塩液 50ml
ドキシソルピシン 56mg 全開
↓
3) 生理食塩液 50ml フラッシュ
Day 2
1) 生理食塩液 50ml
デキサート 6.6mg 30分
↓
2) 生理食塩液 500ml
エトポシド 140mg 75分
↓
3) 生理食塩液 50ml フラッシュ

オランザピンは糖尿病の患者に禁忌
 ★オランザピン5mgはday3 の夕から
 ★デカドロンはday5の朝から
 ★体重1kg増加⇒医師に報告（利尿剤の考慮）
 ★day3からの飲水指導
 （イオン飲料1Lを目安、イオン飲料不得手であれば他の水分可）

オペプリム併用

