


化学療法計画書

治療法名	胚細胞腫瘍：EP																											
コース数	1	コース目																										
治療法コード																												
患者名	名前を入力		性別	年齢																								
患者ID	IDを入力		生年月日																									
部署	指示部署を入力		主治医	科	Dr																							
開始予定日																												
治療内容	Day	1	2	3	4	5	6	7	・	9	・	・	・	・	・	16	・	・	・	・	・	22	・	・	・	・	・	・
	予定日	1/0								1/8						1/15						1/21						
シスプラチン	20 mg/m ²	↓↓↓↓↓																				↓↓↓↓↓						
エトポシド	100 mg/m ²	↓↓↓↓↓																				↓↓↓↓↓						
グラニセトロン	1mg	↓↓↓↓↓																				↓↓↓↓↓						
デキサート	6.6mg	↓↓↓↓↓																				↓↓↓↓↓						
アプレピタント	125mg	↓																				↓						
アプレピタント	80mg	↓↓↓↓↓																				↓↓↓↓↓						
治療開始日			治療間隔		3週毎		予定コース数		コース																			
身長	150	cm	体重	50	kg	BSA	1.40		m ²																			
eGFR	60	ml/min	eGFR/BSA	49		ml/min																						

Day 1-5

投与可否の基準
・ WBC>3,000, かつ好中球>1,500
・ Plt>100,000
・ 発熱なし
・ AST/ALT≤100, T.Bil≤1.5 (T-Bil : 1.5-3 : ETOP50%量)
・ Cr≤1.2
・ PS 0-2
減量基準
・ G-CSFを使用して治療スケジュールを順守する。
・ 肝障害、腎障害時、減量考慮



化学療法計画書

治療法名		胚細胞腫瘍：BEP										
コース数		1		コース目								
治療法コード												
患者名				性別		年齢						
患者ID				生年月日								
部署				主治医		科 Dr						
開始予定日												
治療内容		Day	1	2	3	4	5	6	7	9	16	22
		予定日	1/0		1/8		1/15		1/21			
シスプラチン 20 mg/m ²		↓↓↓↓↓		↓		↓		↓↓↓↓↓				
エトポシド 100 mg/m ²		↓↓↓↓↓		↓		↓		↓↓↓↓↓				
ブレオ 30 mg		↓		↓		↓		↓				
グラニセトロン 1mg		↓↓↓↓↓		↓		↓		↓↓↓↓↓				
デキサート 6.6mg		↓↓↓↓↓		↓		↓		↓↓↓↓↓				
アプレピタント 125mg		↓		↓		↓		↓				
アプレピタント 80mg		↓↓↓↓↓		↓		↓		↓↓↓↓↓				
治療開始日				治療間隔		3週毎		予定コース数		コース		
身長 150 cm		体重 50 kg		BSA 1.40 m ²								
eGFR 60 ml/min		eGFR/BSA 49 ml/min										

Day 1-5

投与可否の基準	
<ul style="list-style-type: none"> ・ WBC>3,000, かつ好中球>1,500 ・ Plt>100,000 ・ 発熱なし ・ AST/ALT≤100, T. Bil≤1.5 (T-Bil : 1.5-3⇒ETOP50%量) ・ Cr≤1.2 ・ PS 0-2 	
減量基準	
<ul style="list-style-type: none"> ・ G-CSFを使用して治療スケジュールを順守する。 ・ 肝障害、腎障害時、減量考慮 	

Day 9, 16

