



化学療法計画書

治療法名	EDP (ETOP/DXR/CDDP)															
コース数	1	コース目														
腫瘍種	副腎がん															
患者名		性別	年齢													
患者ID	生年月日															
部署	主治医	科	Dr													
開始予定日																
治療内容	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	...	15	...	22	...	29	...
	予定日	1/0							1/7		1/14		1/21		1/28	
ドキシソルピシン	40 mg/m ²	↓													↓	
シスプラチン	40 mg/m ²		↓	↓											↓	
エトポシド	100 mg/m ²		↓	↓	↓										↓	↓
グラニセトロン	1mg	↓														
パロノセトロン	0.75mg		↓													
デキサート注	6.6mg		↓	↓	↓											
デキサート注	9.9mg		↓	↓	↓											
アロカリス	235mg		↓													
デカドロン	8mg			↓	↓	↓	↓									
オランザピン	5mg		↓	↓	↓	↓										
ジーラスタ	3.6mg			↓	↓	↓										
治療開始日					治療間隔	4週毎	予定コース数				コース					
身長	150	cm	体重	50	kg	BSA	1.40	m ²								
eGFR	60	mL/min	eGFR/BSA	49	mL/min											

投与開始基準
<ul style="list-style-type: none"> ・WBC>3,000, かつ好中球>2,000 ・Plt>100,000 ・発熱なし ・PS 0-2 ・AST/ALT≤100, T-Bil≤1.5 ・Cr≤1.2



オランザピンは糖尿病の患者に禁忌
 ★オランザピン5mgはday3 の夕から
 ★デカドロンはday5の朝から
 ★体重1kg増加⇒医師に報告 (利尿剤の考慮)
 ★day3からの飲水指導
 (イオン飲料1Lを目安、イオン飲料不得手であれば他の水分可)

オペプリム併用