

# 化学療法計画書

治療法名	GEM/CDDP											
コース数		コース目										
腫瘍種	胆道がん											
患者名		♂	年齢									
患者ID	生年月日											
部署		主治医	科		Dr							
開始予定日												
治療内容	Day	1	2	3	4	5	6	8	15	22	29	30
	予定日	1/0						1/7	1/14	1/21		1/28
ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	↓						↓		↓		
シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	↓						↓		↓		
アロキシ	0.75mg	↓						↓		↓		↓
デキサート	6.6mg	↓						↓		↓		↓
治療開始日				治療間隔	3週毎	予定コース数	コース					
身長	160 cm	体重	50 kg	BSA	1.46 m <sup>2</sup>							
eGFR	79 ml/min	eGFR/BSA	64 ml/min									

投与開始基準
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ PS 2以下</li> <li>・ WBC&gt;3,000, かつ好中球&gt;1,500</li> <li>・ Plt&gt;100,000</li> <li>・ AST/ALT&lt;5×ULN</li> <li>・ T-Bil&lt;1.8, Cr&lt;1.2</li> <li>(CCr45以上:60未満ではCDDP減量考慮)</li> <li>・ G3以上の非血液毒性なし</li> </ul>

day8投与可否の基準
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ WBC&gt;2,000, Plt&gt;70,000</li> <li>・ AST/ALT&lt;5×ULN</li> </ul>

減量基準
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 好中球&lt;500が4日以上持続</li> <li>・ Plt&lt;20,000</li> <li>・ 発熱性好中球減少 →GEM 800に減量</li> <li>・ G3の非血液毒性 →GEM 800, CDDP 20</li> </ul>

## day1・8

- 1) アロキシ 0.75mg  
デキサート 6.6mg 30分
- ↓
- 2) 生理食塩液 1000ml  
シスプラチン 37mg  
KCL 1キット  
硫酸マグネシウム 1A 2h
- ↓
- 3) 生理食塩液 100ml  
ゲムシタビン 1460mg 30分
- ↓
- 4) 生理食塩液 50ml フラッシュ