

# 化学療法計画書

|         |  |                         |  |          |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
|---------|--|-------------------------|--|----------|--|-----------|--|--------|--|---------------------|--|---|--|---|--|---|--|-----|--|------|--|------|--|-----|--|
| 治療法名    |  | TC<br>(パクリタキセル+カルボプラチン) |  |          |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| コース数    |  | 1                       |  | コース目     |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| 腫瘍種     |  | 卵巣がん 子宮体がん              |  |          |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| 患者名     |  |                         |  |          |  |           |  | ♀      |  | 年齢                  |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| 患者ID    |  | 生年月日                    |  |          |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| 部署      |  | 主治医                     |  |          |  | 科         |  | Dr     |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| 開始予定日   |  |                         |  |          |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| 治療内容    |  | Day                     |  | 1        |  | 2         |  | 3      |  | 4                   |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8   |  | 15   |  | 22   |  | 29  |  |
|         |  | 予定日                     |  | 1/0      |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  | 1/7 |  | 1/14 |  | 1/21 |  |     |  |
| パクリタキセル |  | 180 mg/m <sup>2</sup>   |  | ↓        |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  | ↓    |  |     |  |
| カルボプラチン |  | 5 AUC                   |  | ↓        |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  | ↓    |  |     |  |
| アロキシ    |  | 0.75mg                  |  | ↓        |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| ガスター    |  | 1A                      |  | ↓        |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| デキサート   |  | 19.8mg                  |  | ↓        |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| デカドロン   |  | 8mg                     |  | ↓        |  | ↓         |  | ↓      |  | ↓                   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| レスタミン   |  | 5錠                      |  | ↓        |  |           |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| 治療開始日   |  |                         |  | 治療間隔     |  | 3週毎       |  | 予定コース数 |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  | コース |  |
| 身長      |  | 150 cm                  |  | 体重       |  | 50 kg     |  | BSA    |  | 1.40 m <sup>2</sup> |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
| eGFR    |  | 27 ml/min               |  | eGFR/BSA |  | 22 ml/min |  |        |  |                     |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |      |  |     |  |

## Day 1

|  |  |
|--|--|
| 投与開始基準   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>WBC&gt;3000, 好中球&gt;1,500</li> <li>Plt&gt;100,000</li> <li>感染を伴う38°C以上の発熱なし</li> <li>AST/ALT&lt;100</li> <li>T-Bil&lt;1.5</li> <li>Cr&lt;1.2</li> <li>肺毒性G1以下</li> <li>G3以上の非血液毒性なし<br/>→満たさなければ1~3週延期</li> </ul> |  |
| T-Bil ≥ 1.5 PTX減量考慮  |  |
| 減量基準   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>WBC&lt;1,000</li> <li>発熱性好中球減少</li> <li>G3の非血液毒性<br/>→PTX 150, CBDCA AUC=4へ</li> <li>Plt&lt;20,000<br/>→CBDCA AUC=4へ</li> <li>Cr&gt;1.7 →CBDCA AUC=4へ</li> <li>G2以上の末梢神経障害, 筋肉痛, 関節痛 →PTX 150へ</li> </ul>         |  |

|                  |        |       |
|------------------|--------|-------|
| インラインフィルターを使用    |        |       |
| 1) 生理食塩液         | 50ml   | 15分   |
| ガスター             | 1A     |       |
| デキサート            | 19.8mg |       |
| * 点滴中にレスタミン 5錠内服 |        |       |
| ↓                |        |       |
| 2) アロキシ          | 0.75mg | 30分   |
| ↓                |        |       |
| 3) 5%ブドウ糖        | 500ml  | 3h    |
| パクリタキセル          | 250mg  |       |
| ↓                |        |       |
| 4) 5%ブドウ糖        | 250ml  | 60分   |
| カルボプラチン          | 240mg  |       |
| ↓                |        |       |
| 5) 生理食塩液         | 50ml   | フラッシュ |

デカドロンはday 2の朝から

# 化学療法計画書

|         |                                   |               |  |
|---------|-----------------------------------|---------------|--|
| 治療法名    | TC/Bev<br>(パクリタキセル+カルボプラチン+アバスチン) |               |  |
| コース数    | 1                                 | コース目          |  |
| 腫瘍種     | 卵巣がん                              |               |  |
| 患者名     |                                   | ♀             | 年齢   |
| 患者ID    |                                   | 生年月日          |  |
| 部署      |                                   | 主治医           | 科 Dr                                       |
| 開始予定日   |                                   |               |  |
| 治療内容    | Day                               | 1 2 3 4 5 6 7 | 8 . . . . . 15 . . . . . 22 . . . 29 . . . |
|         | 予定日                               | 1/0           | 1/7 1/14 1/21                              |
| パクリタキセル | 180 mg/m <sup>2</sup>             | ↓             | ↓  |
| カルボプラチン | 6 AUC                             | ↓             | ↓  |
| アバスチン   | 15 mg/kg                          | ↓             |  |
| アロキシ    | 0.75mg                            | ↓             |  |
| ガスター    | 1A                                | ↓             |  |
| デキサート   | 19.8mg                            | ↓             |  |
| デカドロン   | 8mg                               | ↓↓↓           |  |
| レスタミン   | 5錠                                | ↓             |  |
| 治療開始日   |                                   | 治療間隔          | 3週毎 予定コース数 6 コース                           |
| 身長      | 160 cm                            | 体重            | 50 kg BSA 1.46 m <sup>2</sup>              |
| eGFR    | 27 ml/min                         | eGFR/BSA      | 23 ml/min                                  |

## Day 1

術後から28日以上経過した患者

|  |
|--|
| <b>投与開始基準</b><br>・ WBC>3000, 好中球>1,500<br>・ Plt>100,000<br>・ 感染を伴う38℃以上の発熱なし<br>・ AST/ALT<100<br>・ T-bil<1.5×ULN<br>・ Cr<1.5×ULN<br>・ 肺毒性G1以下<br>・ G3以上の非血液毒性なし<br>→満たさなければ1~3週延期<br>T-Bil ≥ 1.5 PTX減量考慮 |
| <b>減量基準</b><br>・ WBC<1,000<br>・ 発熱性好中球減少<br>・ G3の非血液毒性<br>→PTX 150, CBDCA AUC=5へ<br>・ Plt<20,000<br>→CBDCA AUC=5へ<br>・ Cr>1.7 →CBDCA AUC=4へ<br>・ G2以上の末梢神経障害, 筋肉痛, 関節痛 →PTX 150へ                         |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| インラインフィルターを使用   |            |
| 1) 生理食塩液        | 50ml 血管確保  |
| ↓               |            |
| 2) 生理食塩液        | 100ml      |
| アバスチン           | 750mg 30分  |
| ↓               |            |
| 3) 生理食塩液        | 50ml 15分   |
| ガスター            | 1A         |
| デキサート           | 19.8mg     |
| *点滴中にレスタミン 5錠内服 |            |
| ↓               |            |
| 4) アロキシ         | 0.75mg 30分 |
| ↓               |            |
| 5) 5%ブドウ糖       | 500ml      |
| パクリタキセル         | 260mg 3h   |
| ↓               |            |
| 6) 5%ブドウ糖       | 250ml      |
| カルボプラチン         | 290mg 60分  |
| ↓               |            |
| 7) 生理食塩液        | 50ml フラッシュ |

|   |
|---|
| <b>アバスチン休薬基準</b><br>1. 出血 G2<br>2. 蛋白尿 G3 (≥300mg/dl)<br>3. 肝機能障害 G3以上  |
| <b>アバスチン中止基準</b><br>1. 過敏症 G3以上<br>2. 消化管穿孔・裂開<br>3. 出血 G3以上<br>4. 血栓症・塞栓症 G3(静脈系)<br>5. 血栓症・塞栓症 G1(動脈系)<br>6. 高血圧 G3以上(薬剤制御不可)<br>7. 蛋白尿 G4<br>8. 中枢神経症状発現 |

デカドロンはday 2の朝から

# 化学療法計画書

|                                 |  |                                |  |                         |   |                          |    |                           |  |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|---|--------------------------|----|---------------------------|--|
| 治療法名                            |  | TC weekly<br>(パクリタキセル+カルボプラチン) |  |                         |   |                          |    |                           |  |
| コース数                            |  | コース目                           |  |                         |   |                          |    |                           |  |
| 腫瘍種                             |  | 卵巣がん 子宮体がん                     |  |                         |   |                          |    |                           |  |
| 患者名                             |  |                                |  |                         | ♀ |                          | 年齢 |                           |  |
| 患者ID                            |  | 生年月日                           |  |                         |   |                          |    |                           |  |
| 部署                              |  | 主治医                            |  | 科                       |   | Dr                       |    |                           |  |
| 開始予定日                           |  |                                |  |                         |   |                          |    |                           |  |
| 治療内容                            |  | Day                            |  | 1 2 3 4 5 6 7           |   | 8 . . . . . 15 . . . . . |    | 22 . . . . . 29 . . . . . |  |
| 予定日                             |  | 1/0                            |  | 1/7                     |   | 1/14                     |    | 1/21                      |  |
| パクリタキセル<br>80 mg/m <sup>2</sup> |  | ↓                              |  | ↓                       |   | ↓                        |    | ↓                         |  |
| カルボプラチン<br>2 AUC                |  | ↓                              |  | ↓                       |   | ↓                        |    | ↓                         |  |
| グラニセトロン<br>1mg                  |  | ↓                              |  | ↓                       |   | ↓                        |    | ↓                         |  |
| ガスター<br>1A                      |  | ↓                              |  | ↓                       |   | ↓                        |    | ↓                         |  |
| デキサート<br>6.6mg                  |  | ↓                              |  | ↓                       |   | ↓                        |    | ↓                         |  |
| レスタミン<br>5錠                     |  | ↓                              |  | ↓                       |   | ↓                        |    | ↓                         |  |
| 治療開始日                           |  | 治療間隔                           |  | 予定コース数                  |   | コース                      |    |                           |  |
| 身長 150 cm                       |  | 体重 50 kg                       |  | BSA 1.40 m <sup>2</sup> |   |                          |    |                           |  |
| eGFR 60 ml/min                  |  | eGFR/BSA 49 ml/min             |  |                         |   |                          |    |                           |  |

## Day1、Day8、Day15

|  |
|--|
| <b>投与開始基準(可否基準)</b><br>・ WBC>3000, 好中球>1,500<br>(day8・15 WBC>2000, 好中球>1000)<br>・ Plt>100,000<br>・ 感染を伴う38℃以上の発熱なし<br>・ GOT/GPT<100<br>・ T-Bil<1.5<br>・ Cr<1.2<br>・ 肺毒性G1以下<br>・ G3以上の非血液毒性なし<br>→満たさなければ1~3週延期<br>T-Bil≥1.5 PTX減量考慮 |
| <b>減量基準</b><br>・ WBC<1,000<br>・ 発熱性好中球減少<br>・ G3の非血液毒性<br>→PTX 60, CBDCA AUC=1.5へ<br>・ Plt<20,000<br>→CBDCA AUC=1.5へ<br>・ Cr>1.7 →CBDCA AUC=1.5へ<br>・ G2以上の末梢神経障害, 筋肉痛,<br>関節痛 →PTX 60へ  |

|                  |       |
|------------------|-------|
| インラインフィルターを使用    |       |
| 1) 生理食塩液 50ml    | 15分   |
| ガスター 1A          |       |
| デキサート 6.6mg      |       |
| * 点滴中にレスタミン 5錠内服 |       |
| ↓                |       |
| 2) グラニセトロン 1mg   | 30分   |
| ↓                |       |
| 3) 5%ブドウ糖 250ml  |       |
| パクリタキセル 110mg    | 60分   |
| ↓                |       |
| 4) 5%ブドウ糖 250ml  |       |
| カルボプラチン 150mg    | 60分   |
| ↓                |       |
| 5) 生理食塩液 50ml    | フラッシュ |

# 化学療法計画書

|         |                      |        |          |      |    |     |        |     |   |                |    |      |       |      |    |     |
|---------|----------------------|--------|----------|------|----|-----|--------|-----|---|----------------|----|------|-------|------|----|-----|
| 治療法名    | CBDCA/weeklyPAC      |        |          |      |    |     |        |     |   |                |    |      |       |      |    |     |
| コース数    | 1                    | コース目   |          |      |    |     |        |     |   |                |    |      |       |      |    |     |
| 腫瘍種     | 卵巣がん 卵管がん 腹膜がん       |        |          |      |    |     |        |     |   |                |    |      |       |      |    |     |
| 患者名     |                      |        |          | ♀    | 年齢 |     |        |     |   |                |    |      |       |      |    |     |
| 患者ID    |                      |        |          | 生年月日 |    |     |        |     |   |                |    |      |       |      |    |     |
| 部署      |                      |        |          | 主治医  | 科  | Dr  |        |     |   |                |    |      |       |      |    |     |
| 開始予定日   |                      |        |          |      |    |     |        |     |   |                |    |      |       |      |    |     |
| 治療内容    | Day                  | 1      | 2        | 3    | 4  | 5   | 6      | 7   | 8 | ...            | 15 | ...  | 22    | ...  | 29 | ... |
|         | 予定日                  | 1/0    |          |      |    |     |        | 1/7 |   |                |    | 1/14 |       | 1/21 |    |     |
| パクリタキセル | 80 mg/m <sup>2</sup> | ↓      |          |      |    |     |        | ↓   |   |                |    | ↓    |       |      |    | ↓   |
| カルボプラチン | 6 AUC                | ↓      |          |      |    |     |        | ↓   |   |                |    | ↓    |       |      |    | ↓   |
| アロキシ    | 0.75mg               | ↓      |          |      |    |     |        | ↓   |   |                |    | ↓    |       |      |    | ↓   |
| ガスター    | 20mg                 | ↓      |          |      |    |     |        | ↓   |   |                |    | ↓    |       |      |    | ↓   |
| デキサート   | 6.6mg                | ↓      |          |      |    |     |        | ↓   |   |                |    | ↓    |       |      |    | ↓   |
| レスタミン   | 5錠                   | ↓      |          |      |    |     |        | ↓   |   |                |    | ↓    |       |      |    | ↓   |
| デカドロン   | 8mg                  | ↓      |          | ↓    |    | ↓   |        | ↓   |   |                |    | ↓    |       | ↓    |    | ↓   |
| 治療開始日   |                      |        |          | 治療間隔 |    |     |        |     |   | 予定コース数         |    |      | 6 コース |      |    |     |
| 身長      | 150                  | cm     | 体重       | 50   | kg | BSA | 1.40   |     |   | m <sup>2</sup> |    |      |       |      |    |     |
| eGFR    | 60                   | ml/min | eGFR/BSA | 49   |    |     | ml/min |     |   |                |    |      |       |      |    |     |

|  |
|--|
| 投与開始基準 (day1) 可否基準   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>好中球&gt;1000</li> <li>(day8・15 好中球&gt;500)</li> <li>Plt&gt;75,000</li> <li>(day8・15 血小板&gt;50000)</li> <li>感染を伴う38℃以上の発熱なし</li> <li>AST/ALT&lt;100</li> <li>T-Bil&lt;1.5</li> <li>Cr&lt;1.2</li> <li>肺毒性G1以下</li> <li>G3以上の非血液毒性なし</li> <li>→満たさなければ1~3週延期</li> <li>T-Bil≥1.5 PAC減量考慮</li> </ul> |
| 減量基準   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>WBC&lt;1,000</li> <li>発熱性好中球減少</li> <li>G3の非血液毒性</li> <li>→PAC 60, CBDCA AUC=5へ</li> <li>Plt&lt;20,000</li> <li>→CBDCA AUC=5へ</li> <li>Cr&gt;1.7 →CBDCA AUC=5へ</li> <li>G2以上の末梢神経障害, 筋肉痛, 関節痛</li> </ul>  |

★デカドロン錠はday2朝から内服

|                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| Day1            |        |       |
| インラインフィルターを使用   |        |       |
| 1) 生理食塩液        | 50ml   | 15分   |
| ガスター            | 1 A    |       |
| デキサート           | 6.6mg  |       |
| *点滴中にレスタミン 5錠内服 |        |       |
| ↓               |        |       |
| 2) アロキシ         | 0.75mg | 30分   |
| ↓               |        |       |
| 3) 5%ブドウ糖       | 250ml  |       |
| パクリタキセル         | 110mg  | 60分   |
| ↓               |        |       |
| 4) 5%ブドウ糖       | 250ml  |       |
| カルボプラチン         | 440mg  | 60分   |
| ↓               |        |       |
| 5) 生理食塩液        | 50ml   | フラッシュ |

|   |
|---|
| 投与可否基準 (day8, 15)   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>好中球&gt;500</li> <li>血小板&gt;50,000</li> </ul> |

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Day8, 15        |       |       |
| インラインフィルターを使用   |       |       |
| 1) 生理食塩液        | 50ml  | 15分   |
| ガスター            | 1 A   |       |
| デキサート           | 6.6mg |       |
| *点滴中にレスタミン 5錠内服 |       |       |
| ↓               |       |       |
| 2) 生理食塩液        | 100ml | 30分   |
| ↓               |       |       |
| 3) 5%ブドウ糖       | 250ml |       |
| パクリタキセル         | 112mg | 60分   |
| ↓               |       |       |
| 4) 生理食塩液        | 50ml  | フラッシュ |

# 化学療法計画書

|                               |            |  |            |
|-------------------------------|------------|--|------------|
| 治療法名                          | GEM/CBDCA  |  |            |
| コース数                          | 1          | コース目   |            |
| 腫瘍種                           | 非小細胞肺がん    | 尿路上皮がん   | 卵巣がん       |
| 患者名                           |            | ♀  | 年齢         |
| 患者ID                          | 生年月日       |  |            |
| 部署                            |            | 主治医  | Dr         |
| 開始予定日                         |            |  |            |
| 治療内容                          | Day        | 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . . 15 . . . . . 22 . . . . . 29 . . . . . |            |
|                               | 予定日        | 1/0 1/7 1/14 1/21 1/28   |            |
| ゲムシタビン 1000 mg/m <sup>2</sup> |            | ↓  | ↓ ↓        |
| カルボプラチン 5 AUC                 |            | ↓  | ↓ ↓        |
| アロキシ 0.75mg                   |            | ↓  |            |
| デキサート 6.6mg                   |            | ↓  |            |
| デカドロン 8mg                     |            | ↓↓↓  |            |
| 治療開始日                         |            | 治療間隔   | 3週毎 予定コース数 |
| 身長 149.3 cm                   | 体重 46.4 kg | BSA 1.35 m <sup>2</sup>  | コース        |
| eGFR 59 ml/min                | eGFR/BSA   | 46 ml/min  |            |

## Day 1

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>投与開始基準</b>                      |
| ・ WBC>3,000                        |
| ・ Plt>100,000                      |
| ・ AST/ALT<100                      |
| <b>減量基準</b>                        |
| ・ G4の白血球/好中球減少                     |
| ・ 発熱を伴う好中球減少                       |
| →いずれかでGEM 800mg/m <sup>2</sup> に減量 |
| ・ G4の血小板減少                         |
| →CBDCAのAUC 1減量                     |

|                |             |       |
|----------------|-------------|-------|
| 1) アロキシ 0.75mg | デキサート 6.6mg | 30min |
|----------------|-------------|-------|

|                |               |     |
|----------------|---------------|-----|
| 2) 生理食塩液 100ml | ゲムシタビン 1350mg | 30分 |
|----------------|---------------|-----|

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| 3) 5%ブドウ糖 250ml | カルボプラチン 360mg | 60分 |
|-----------------|---------------|-----|

|               |       |
|---------------|-------|
| 4) 生理食塩液 50ml | フラッシュ |
|---------------|-------|

デカドロンはday 2の朝から

## Day 8

|                |
|----------------|
| <b>投与可否の基準</b> |
| ・ WBC>2,000    |
| ・ Plt>70,000   |
| ・ AST/ALT<100  |

|               |             |     |
|---------------|-------------|-----|
| 1) 生理食塩液 50ml | デキサート 6.6mg | 30分 |
|---------------|-------------|-----|

|                |               |     |
|----------------|---------------|-----|
| 2) 生理食塩液 100ml | ゲムシタビン 1350mg | 30分 |
|----------------|---------------|-----|

|               |       |
|---------------|-------|
| 3) 生理食塩液 50ml | フラッシュ |
|---------------|-------|

# 化学療法計画書

|         |                        |  |                               |
|---------|------------------------|--|-------------------------------|
| 治療法名    | GEM/CBDCA/BEV          |  |                               |
| コース数    |                        | コース目   |                               |
| 腫瘍種     | 卵巣がん                   |  |                               |
| 患者名     |                        | ♀  | 年齢                            |
| 患者ID    |                        | 生年月日   |                               |
| 部署      |                        | 主治医  | 科 Dr                          |
| 開始予定日   |                        |  |                               |
| 治療内容    | Day                    | 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . . 15 . . . . . 22 . . . 29 . . .         |                               |
|         | 予定日                    | 1/0 . . . . . 1/7 . . . . . 1/14 . . . . . 1/21 . . . 1/28 . . . |                               |
| ゲムシタビン  | 1000 mg/m <sup>2</sup> | ↓  | ↓                             |
| カルボプラチン | 4 AUC                  | ↓  | ↓                             |
| アバスタチン  | 15 mg/kg               | ↓  | ↓                             |
| アロキシ    | 0.75mg                 | ↓  | ↓                             |
| デキサート   | 6.6mg                  | ↓  | ↓                             |
| デカドロン   | 8mg                    | ↓↓↓  | ↓↓↓                           |
| 治療開始日   |                        | 治療間隔   | 3週毎 予定コース数                    |
| 身長      | 150 cm                 | 体重   | 50 kg BSA 1.40 m <sup>2</sup> |
| eGFR    | 27 ml/min              | eGFR/BSA   | 22 ml/min                     |

## Day 1

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>投与開始準</b>                       |
| ・ WBC>3,000                        |
| ・ Plt>100,000                      |
| ・ AST/ALT<100                      |
| <b>減量基準</b>                        |
| ・ G4の白血球/好中球減少                     |
| ・ 発熱を伴う好中球減少                       |
| →いずれかでGEM 800mg/m <sup>2</sup> に減量 |
| ・ G4の血小板減少                         |
| →CBDCAのAUC 1減量                     |

- 1) 生理食液 50ml | 血管確保
- ↓
- 2) 生理食塩液 100ml | アバスタチン 750mg 30分
- ↓
- 3) アロキシ 0.75mg | デキサート 6.6mg 30分
- ↓
- 4) 生理食塩液 100ml | ゲムシタビン 1400mg 30分
- ↓
- 5) 5%ブドウ糖 250ml | カルボプラチン 190mg 60分
- ↓
- 6) 生理食塩液 50ml | フラッシュ

デカドロンはday2の朝から

## Day 8

|                |
|----------------|
| <b>投与可否の基準</b> |
| ・ WBC>2,000    |
| ・ Plt>70,000   |
| ・ AST/ALT<100  |

- 1) 生理食塩液 50ml | デキサート 6.6mg 30分
- ↓
- 2) 生理食塩液 100ml | ゲムシタビン 1400mg 30分
- ↓
- 3) 生理食塩液 50ml | フラッシュ

|                       |
|-----------------------|
| <b>アバスタチン休薬基準</b>     |
| 1. 出血 G2              |
| 2. 蛋白尿 G3 (≥300mg/dl) |
| 3. 肝機能障害 G3以上         |
| <b>アバスタチン中止基準</b>     |
| 1. 過敏症 G3以上           |
| 2. 消化管穿孔・裂開           |
| 3. 出血 G3以上            |
| 4. 血栓症・塞栓症 G3(静脈系)    |
| 5. 血栓症・塞栓症 G1(動脈系)    |
| 6. 高血圧 G3以上(薬剤制御不可)   |
| 7. 蛋白尿 G4             |
| 8. 中枢神経症状発現           |

# 化学療法計画書

|                               |           |          |           |  |                     |                       |                 |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 治療法名                          |           | GEM+BEV  |           |  |                     |                       |                 |
| コース数                          |           | 1        |           | コース目                                   |                     |                       |                 |
| 腫瘍種                           |           | 卵巣がん     |           |  |                     |                       |                 |
| 患者名                           |           |          |           |  |                     | ♀                     | 年齢              |
| 患者ID                          |           |          |           |  |                     | 生年月日                  |                 |
| 開始予定日                         |           |          |           | 部署                                     |                     | 主治医                   |                 |
| 治療内容                          |           | Day      |           | 1 2 3 4 5 6 7 8 . . . . . 15 . . . . . |                     | 22 . . . . 29 . . . . |                 |
| 予定日                           |           | 1/0      |           | 1/7                                    |                     | 1/14                  | 1/21 1/28       |
| ゲムシタビン 1000 mg/m <sup>2</sup> |           | ↓        |           | ↓                                      |                     |                       |                 |
| アバステン 15 mg/kg                |           | ↓        |           |  |                     |                       | ↓               |
| 治療開始日                         |           |          |           | 治療間隔                                   |                     | 3週毎                   | 予定コース数 PDまで コース |
| 身長                            | 160 cm    | 体重       | 50 kg     | BSA                                    | 1.46 m <sup>2</sup> |                       |                 |
| eGFR                          | 27 ml/min | eGFR/BSA | 23 ml/min |  |                     |                       |                 |

|  |  |
|--|--|
| 投与開始基準   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>WBC&gt;3,000</li> <li>Plt&gt;100,000</li> <li>AST/ALT&lt;100</li> </ul> |  |

## Day 1

- 1) 生理食塩液 50ml  
デキサート 6.6mg 30分
- ↓
- 2) 生理食塩液 100ml  
アバステン 750mg 30分
- ↓
- 3) 生理食塩液 100ml  
ゲムシタビン 1460mg 30分
- ↓
- 4) 生理食塩液 50ml フラッシュ

|   |  |
|---|--|
| アバステン休薬基準   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>出血 G2</li> <li>蛋白尿 G3 (≥300mg/dl)</li> <li>肝機能障害 G3以上</li> </ol>   |  |
| アバステン中止基準   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>過敏症 G3以上</li> <li>消化管穿孔・裂開</li> <li>出血 G3以上</li> <li>血栓症・塞栓症 G3(静脈系)</li> <li>血栓症・塞栓症 G1(動脈系)</li> <li>高血圧 G3以上(薬剤制御不可)</li> <li>蛋白尿 G4</li> <li>中枢神経症状発現</li> </ol> |  |

## Day 8

- 1) 生理食塩液 50ml  
デキサート 6.6mg 30分
- ↓
- 2) 生理食塩液 100ml  
ゲムシタビン 1460mg 30分
- ↓
- 3) 生理食塩液 50ml フラッシュ

# 化学療法計画書

|       |     |                |          |      |    |        |      |        |    |      |     |     |     |      |     |      |      |
|-------|-----|----------------|----------|------|----|--------|------|--------|----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|
| 治療法名  |     | BEV維持療法15mg/kg |          |      |    |        |      |        |    |      |     |     |     |      |     |      |      |
| コース数  |     | 1              |          | コース目 |    |        |      |        |    |      |     |     |     |      |     |      |      |
| 腫瘍種   |     | 卵巣がん           |          |      |    |        |      |        |    |      |     |     |     |      |     |      |      |
| 患者名   |     |                |          |      |    | ♀      | 年齢   |        |    |      |     |     |     |      |     |      |      |
| 患者ID  |     |                |          |      |    | 生年月日   |      |        |    |      |     |     |     |      |     |      |      |
| 部署    |     |                |          | 主治医  |    |        |      |        |    |      |     |     |     |      |     |      |      |
| 開始予定日 |     |                |          |      |    |        |      |        |    |      |     |     |     |      |     |      |      |
| 治療内容  |     | Day            | 1        | 2    | 3  | 4      | 5    | 6      | 7  | 8    | ... | 15  | ... | 22   | ... | 29   |      |
| 予定日   |     |                | 1/0      |      |    |        |      |        |    | 1/7  |     |     |     | 1/14 |     | 1/21 | 1/28 |
| アバステン |     | 15 mg/kg       | ↓        |      |    |        |      |        |    |      |     |     |     |      |     |      |      |
| 治療開始日 |     |                |          | 治療間隔 |    | 3週毎    |      | 予定コース数 |    | PDまで |     | コース |     |      |     |      |      |
| 身長    | 160 | cm             | 体重       | 50   | kg | BSA    | 1.46 |        | m2 |      |     |     |     |      |     |      |      |
| eGFR  | 27  | ml/min         | eGFR/BSA | 23   |    | ml/min |      |        |    |      |     |     |     |      |     |      |      |

## Day 1

- 1) 生理食塩液 50ml 血管確保  
↓
- 2) 生理食塩液 100ml  
アバステン 750mg 30分  
↓
- 3) 生理食塩液 50ml フラッシュ

|                       |
|-----------------------|
| アバステン休薬基準             |
| 1. 出血 G2              |
| 2. 蛋白尿 G3 (≥300mg/dl) |
| 3. 肝機能障害 G3以上         |
| アバステン中止基準             |
| 1. 過敏症 G3以上           |
| 2. 消化管穿孔・裂開           |
| 3. 出血 G3以上            |
| 4. 血栓症・塞栓症 G3(静脈系)    |
| 5. 血栓症・塞栓症 G1(動脈系)    |
| 6. 高血圧 G3以上(薬剤制御不可)   |
| 7. 蛋白尿 G4             |
| 8. 中枢神経症状発現           |



# 化学療法計画書

|         |                      |        |          |      |     |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
|---------|----------------------|--------|----------|------|-----|--------|--------|----------------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|
| 治療法名    | DOC/ CBDCA           |        |          |      |     |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
| コース数    | 1                    | コース目   |          |      |     |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
| 腫瘍種     |                      |        |          |      |     |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
| 患者名     |                      |        |          | ♀    | 年齢  |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
| 患者ID    |                      |        |          | 生年月日 |     |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
| 部署      |                      |        |          | 主治医  |     |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
| 開始予定日   |                      |        |          |      |     |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
| 治療内容    | Day                  | 1      | 2        | 3    | 4   | 5      | 6      | 7              | 8   | ..... | 15   | ..... | 22   | ..... | 29   |
|         | 予定日                  | 1/0    |          |      |     |        |        |                | 1/7 |       | 1/14 |       | 1/21 |       | 1/28 |
| ドセタキセル  | 70 mg/m <sup>2</sup> | ↓      |          |      |     |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
| カルボプラチン | 5 AUC                | ↓      |          |      |     |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
| アロキシ    | 0.75mg               | ↓      |          |      |     |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
| デキサート   | 6.6mg                | ↓      |          |      |     |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
| デカドロン   | 8mg                  | ↓↓↓    |          |      |     |        |        |                |     |       |      |       |      |       |      |
| 治療開始日   |                      |        |          | 治療間隔 | 3週毎 | 予定コース数 |        |                |     |       | コース  |       |      |       |      |
| 身長      | 165                  | cm     | 体重       | 57.6 | kg  | BSA    | 1.59   | m <sup>2</sup> |     |       |      |       |      |       |      |
| eGFR    | 60                   | ml/min | eGFR/BSA |      |     | 55     | ml/min |                |     |       |      |       |      |       |      |

## Day 1

|   |
|---|
| <b>投与可否の基準</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>WBC&gt;3,000, かつ好中球&gt;2,000</li> <li>Plt&gt;100,000</li> <li>AST/ALT&lt;100</li> <li>(AST/ALT&gt;1.5xULNかつALP&gt;2.5xULN, またはT-Bil&gt;1.2) →DOC減量考慮</li> <li>G2以上の非血液毒性なし →満たさなければ1~2週延期</li> </ul> |
| <b>減量基準</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>WBC&lt;1000</li> <li>好中球&lt;500が4日以上持続</li> <li>発熱性好中球減少 →DOC60へ</li> <li>Plt&lt;20,000 →CBDCA AUC 1減</li> <li>持続するG2以上の神経毒性</li> <li>コントロール不能の浮腫・胸水 →中止</li> </ul>                                  |



デカドロンはday 2の朝から

# 化学療法計画書

|      |                   |      |    |
|------|-------------------|------|----|
| 治療法名 | イリノテカン週1回         |      |    |
| コース数 | 1                 | コース目 |    |
| 腫瘍種  | 小細胞肺がん 卵巣がん 子宮体がん |      |    |
| 患者名  |                   | ♀    | 年齢 |
| 患者ID | 生年月日              |      |    |
| 部署   | 主治医               |      | Dr |

開始予定日

|        |                      |        |          |           |     |     |                     |   |     |       |      |       |    |       |    |       |
|--------|----------------------|--------|----------|-----------|-----|-----|---------------------|---|-----|-------|------|-------|----|-------|----|-------|
| 治療内容   | Day                  | 1      | 2        | 3         | 4   | 5   | 6                   | 7 | 8   | ..... | 15   | ..... | 22 | ..... | 29 | ..... |
|        | 予定日                  | 1/0    |          |           |     |     |                     |   | 1/7 |       | 1/14 |       |    |       |    | 1/28  |
| イリノテカン | 80 mg/m <sup>2</sup> | ↓      |          |           |     |     |                     |   | ↓   |       | ↓    |       |    |       |    | ↓     |
| アロキシ   | 0.75mg               | ↓      |          |           |     |     |                     |   | ↓   |       | ↓    |       |    |       |    |       |
| デキサート  | 6.6mg                | ↓      |          |           |     |     |                     |   | ↓   |       | ↓    |       |    |       |    |       |
| 治療開始日  | 2013年9月4日            |        | 治療間隔     |           | 4週毎 |     | 予定コース数              |   | コース |       |      |       |    |       |    |       |
| 身長     | 169.1                | cm     | 体重       | 66.8      | kg  | BSA | 1.72 m <sup>2</sup> |   |     |       |      |       |    |       |    |       |
| eGFR   | 60                   | ml/min | eGFR/BSA | 60 ml/min |     |     |                     |   |     |       |      |       |    |       |    |       |

## Day 1

|       |  |
|-------|--|
| 投与開始準 | <ul style="list-style-type: none"> <li>WBC&gt;3000, かつ好中球&gt;2000</li> <li>Plt&gt;100000</li> <li>下痢なし</li> <li>肝・腎機能値 2 倍以下</li> <li>T-Bil ≥ 2.1 禁忌or (減量考慮50%量)</li> </ul> |
| 減量基準  | 前コースでスキップの時 -10mg/m <sup>2</sup>   |

- 1) アロキシ 0.75mg  
デキサート 6.6mg 30分
- ↓
- 2) 5%ブドウ糖 500ml  
イリノテカン 138mg 90分
- ↓
- 3) 生理食塩液 50ml フラッシュ

## Day 8、15

|         |   |
|---------|---|
| 投与可否の基準 | <ul style="list-style-type: none"> <li>WBC&gt;3,000</li> <li>Plt&gt;75,000</li> <li>下痢</li> <li>→満たさなければスキップ</li> </ul> |
|---------|---|

- 1) アロキシ 0.75mg  
デキサート 6.6mg 30分
- ↓
- 2) 5%ブドウ糖 500ml  
イリノテカン 138mg 90分
- ↓
- 3) 生理食塩液 50ml フラッシュ

# 化学療法計画書

|      |            |      |    |
|------|------------|------|----|
| 治療法名 | AP (THP-P) |      |    |
| コース数 | 1          | コース目 |    |
| 腫瘍種  | 子宮体がん      |      |    |
| 患者名  |            | ♀    | 年齢 |
| 患者ID | 生年月日       |      |    |
| 部署   |            | 主治医  | Dr |

開始予定日

|        |                      |        |               |           |     |     |                     |        |      |     |    |     |      |     |      |      |
|--------|----------------------|--------|---------------|-----------|-----|-----|---------------------|--------|------|-----|----|-----|------|-----|------|------|
| 治療内容   | Day                  | 1      | 2             | 3         | 4   | 5   | 6                   | 7      | 8    | ... | 15 | ... | 22   | ... | 29   | 30   |
|        | 予定日                  | 1/0    |               |           |     |     |                     |        | 1/7  |     |    |     | 1/14 |     | 1/21 | 1/28 |
| ピノルビン  | 40 mg/m <sup>2</sup> | ↓      |               |           |     |     |                     |        |      |     |    |     | ↓    |     |      |      |
| シスプラチン | 50 mg/m <sup>2</sup> | ↓      |               |           |     |     |                     |        |      |     |    |     | ↓    |     |      |      |
| アロキシ   | 0.75mg               | ↓      |               |           |     |     |                     |        |      |     |    |     | ↓    |     |      |      |
| デキサート  | 9.9mg                | ↓      |               |           |     |     |                     |        |      |     |    |     | ↓    |     |      |      |
| プロイメンド | 150mg                | ↓      | (抗がん剤開始 1時間前) |           |     |     |                     |        |      |     |    |     | ↓    |     |      |      |
| デカドロン  | 8mg                  |        | ↓             | ↓         | ↓   |     |                     |        |      |     |    |     | ↓    | ↓   | ↓    | ↓    |
| オランザピン | 5mg                  |        | ↓             | ↓         | ↓   | ↓   |                     |        |      |     |    |     | ↓    | ↓   | ↓    | ↓    |
| 治療開始日  | 2001年8月1日            |        |               | 治療間隔      | 3週毎 |     |                     | 予定コース数 | 6コース |     |    |     |      |     |      |      |
| 身長     | 160                  | cm     | 体重            | 50        | kg  | BSA | 1.46 m <sup>2</sup> |        |      |     |    |     |      |     |      |      |
| eGFR   | 60                   | ml/min | eGFR/BSA      | 51 ml/min |     |     |                     |        |      |     |    |     |      |     |      |      |


## Day 1

|  |
|--|
| <b>投与開始基準</b><br>・ WBC>3000 好中球>1500<br>・ Plt>100,000<br>・ PS 0-2<br>・ AST/ALT ≤ 100, T-Bil ≤ 1.5<br>・ Cr ≤ 1.2<br>(* CCr : 30-60 ⇒ CDDPIは50-75%量に)<br>(* T-Bil ≥ 1.5 ⇒ ピノルビン減量考慮) |
|--|

|   |
|---|
| <b>減量基準</b><br>1. G4の白血球減少または好中球減少<br>2. 発熱性好中球減少<br>3. 血小板5万未満<br>⇒ ピノルビン20%減量 |
|---|

\* ピノルビン総投与量の制限 : ≤ 950mg/m<sup>2</sup>

## 400ml/時



**オランザピンは糖尿病の患者に禁忌**

★オランザピン5mg錠はday 1の夕から

★デカドロン錠はday2の朝から


★イオン飲料水1000mlを3日間

# 化学療法計画書

|        |  |                      |        |      |          |     |    |        |   |     |     |      |                |      |     |     |     |      |     |    |     |      |  |  |  |     |  |  |  |      |  |
|--------|--|----------------------|--------|------|----------|-----|----|--------|---|-----|-----|------|----------------|------|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|------|--|--|--|-----|--|--|--|------|--|
| 治療法名   |  | シスプラチン放射線併用毎週        |        |      |          |     |    |        |   |     |     |      |                |      |     |     |     |      |     |    |     |      |  |  |  |     |  |  |  |      |  |
| コース数   |  | 1                    |        | コース目 |          |     |    |        |   |     |     |      |                |      |     |     |     |      |     |    |     |      |  |  |  |     |  |  |  |      |  |
| 腫瘍種    |  | 子宮頸がん                |        |      |          |     |    |        |   |     |     |      |                |      |     |     |     |      |     |    |     |      |  |  |  |     |  |  |  |      |  |
| 患者名    |  |                      |        |      |          |     | ♀  | 年齢     |   |     |     |      |                |      |     |     |     |      |     |    |     |      |  |  |  |     |  |  |  |      |  |
| 患者ID   |  | 生年月日                 |        |      |          |     |    |        |   |     |     |      |                |      |     |     |     |      |     |    |     |      |  |  |  |     |  |  |  |      |  |
| 部署     |  | 主治医                  |        | 科    |          |     | Dr |        |   |     |     |      |                |      |     |     |     |      |     |    |     |      |  |  |  |     |  |  |  |      |  |
| 開始予定日  |  |                      |        |      |          |     |    |        |   |     |     |      |                |      |     |     |     |      |     |    |     |      |  |  |  |     |  |  |  |      |  |
| 治療内容   |  | Day                  | 1      | 2    | 3        | 4   | 5  | 6      | 7 | 8   | ... | 15   | ...            | 22   | ... | 29  | ... | 36   | ... | 43 | ... |      |  |  |  |     |  |  |  |      |  |
|        |  | 予定日                  | 1/0    |      |          |     |    |        |   | 1/7 |     |      |                | 1/14 |     |     |     | 1/21 |     |    |     | 1/28 |  |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/11 |  |
| シスプラチン |  | 40 mg/m <sup>2</sup> | ↓      |      |          |     |    |        |   | ↓   |     |      |                | ↓    |     |     |     | ↓    |     |    |     | ↓    |  |  |  | ↓   |  |  |  |      |  |
| アロキシ   |  | 0.75mg               | ↓      |      |          |     |    |        |   | ↓   |     |      |                | ↓    |     |     |     | ↓    |     |    |     | ↓    |  |  |  | ↓   |  |  |  |      |  |
| デキサート  |  | 6.6mg                | ↓      |      |          |     |    |        |   | ↓   |     |      |                | ↓    |     |     |     | ↓    |     |    |     | ↓    |  |  |  | ↓   |  |  |  |      |  |
| デカドロン  |  | 8 mg                 | ↓↓↓    |      |          |     |    |        |   | ↓↓↓ |     |      |                | ↓↓↓  |     |     |     | ↓↓↓  |     |    |     | ↓↓↓  |  |  |  | ↓↓↓ |  |  |  |      |  |
| 治療開始日  |  | 1999年2月3日            |        | 治療間隔 |          | 1週毎 |    | 予定コース数 |   | 1   |     | コース  |                | 1    |     | コース |     |      |     |    |     |      |  |  |  |     |  |  |  |      |  |
| 身長     |  | 163.7                | cm     |      | 体重       |     | 53 | kg     |   | BSA |     | 1.52 | m <sup>2</sup> |      | 計6回 |     |     |      |     |    |     |      |  |  |  |     |  |  |  |      |  |
| eGFR   |  | 60                   | ml/min |      | eGFR/BSA |     | 53 | ml/min |   |     |     |      |                |      |     |     |     |      |     |    |     |      |  |  |  |     |  |  |  |      |  |

Day 1、 8、 15、 22、 29、 36

|   |  |
|---|--|
| 投与開始基準  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>WBC&gt;3,000, かつ好中球&gt;1,500 (day8以降 WBC&gt;2000 好中球&gt;1000)</li> <li>Plt&gt;100,000</li> <li>AST/ALT&lt;100, T.bil&lt;1.8, Cr&lt;1.2 (Cr60未満ではCDDP減量考慮)</li> <li>G3以上の非血液毒性なし</li> </ul> |  |



デカドロンはday2の朝から

# 化学療法計画書

|      |        |      |    |
|------|--------|------|----|
| 治療法名 | CDDP75 |      |    |
| コース数 | 1      | コース目 |    |
| 腫瘍種  | 子宮頸がん  |      |    |
| 患者名  |        | ♀    | 年齢 |
| 患者ID |        | 生年月日 |    |
|      |        | 主治医  | Dr |

開始予定日


|        |                      |        |          |    |    |     |        |                |     |     |    |     |      |     |    |      |      |
|--------|----------------------|--------|----------|----|----|-----|--------|----------------|-----|-----|----|-----|------|-----|----|------|------|
| 治療内容   | Day                  | 1      | 2        | 3  | 4  | 5   | 6      | 7              | 8   | ... | 15 | ... | 22   | ... | 29 | ...  |      |
|        | 予定日                  | 1/0    |          |    |    |     |        |                | 1/7 |     |    |     | 1/14 |     |    | 1/21 | 1/28 |
| シスプラチン | 75 mg/m <sup>2</sup> | ↓      |          |    |    |     |        |                |     |     |    |     | ↓    |     |    |      |      |
| アロキシ   | 0.75mg               | ↓      |          |    |    |     |        |                |     |     |    |     | ↓    |     |    |      |      |
| デキサート  | 9.9mg                | ↓      |          |    |    |     |        |                |     |     |    |     | ↓    |     |    |      |      |
| プロイメント | 150mg                | ↓      |          |    |    |     |        |                |     |     |    |     | ↓    |     |    |      |      |
| デカドロン  | 8mg                  |        | ↓        | ↓  | ↓  |     |        |                |     |     |    |     |      | ↓   | ↓  | ↓    |      |
| オランザピン | 5mg                  |        | ↓        | ↓  | ↓  | ↓   |        |                |     |     |    |     |      | ↓   | ↓  | ↓    |      |
| 治療開始日  |                      |        |          |    |    |     |        |                |     |     |    |     |      |     |    |      |      |
| 身長     | 160                  | cm     | 体重       | 50 | kg | BSA | 1.46   | m <sup>2</sup> |     |     |    |     |      |     |    |      |      |
| eGFR   | 60                   | ml/min | eGFR/BSA |    |    | 51  | ml/min |                |     |     |    |     |      |     |    |      |      |

## Day 1

| 投与開始基準   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>WBC&gt;3,000, かつ好中球&gt;1,500</li> <li>Plt&gt;100,000</li> <li>AST/ALT&lt;100, T-Bil&lt;1.8, Cr&lt;1.2 (Cr 60未満ではCDDP減量考慮)</li> <li>肺毒性G1以下</li> <li>G3以上の非血液毒性なし</li> </ul> |

| 減量基準   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>好中球&lt;500が4日以上持続</li> <li>Plt&lt;20,000</li> <li>発熱性好中球減少<br/>→CDDP 60に減量</li> <li>Cr&gt;1.5 →CDDP 60</li> <li>G3の非血液毒性</li> <li>G2以上の末梢神経障害,<br/>→ CDDP 60</li> </ul> |

## 400ml/時



**オランザピンは糖尿病の患者に禁忌**  
 ★オランザピン5mg錠はday 1の夕から  
 ★デカドロン錠はday2の朝から  
 ★イオン飲料水1000mlを3日間

# 化学療法計画書

|      |          |      |    |
|------|----------|------|----|
| 治療法名 | CDDP/TOP |      |    |
| コース数 | 1        | コース目 |    |
| 腫瘍種  | 婦人科がん    |      |    |
| 患者名  |          | ♀    | 年齢 |
| 患者ID |          | 生年月日 |    |
|      |          | 主治医  | Dr |

開始予定日

|        |                        |        |          |    |        |     |      |                |     |     |      |     |      |     |      |     |
|--------|------------------------|--------|----------|----|--------|-----|------|----------------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 治療内容   | Day                    | 1      | 2        | 3  | 4      | 5   | 6    | 7              | 8   | ... | 15   | ... | 22   | ... | 29   | ... |
|        | 予定日                    | 1/0    |          |    |        |     |      |                | 1/7 |     | 1/14 |     | 1/21 |     | 1/28 |     |
| シスプラチン | 50 mg/m <sup>2</sup>   | ↓      |          |    |        |     |      |                |     |     |      |     | ↓    |     |      |     |
| ハイカムチン | 0.75 mg/m <sup>2</sup> | ↓↓↓    |          |    |        |     |      |                |     |     |      |     | ↓↓↓  |     |      |     |
| アロキシ   | 0.75mg                 | ↓      |          |    |        |     |      |                |     |     |      |     | ↓    |     |      |     |
| デキサート  | 9.9mg                  | ↓      |          |    |        |     |      |                |     |     |      |     | ↓    |     |      |     |
| プロイメンド | 150mg                  | ↓      |          |    |        |     |      |                |     |     |      |     | ↓    |     |      |     |
| デカドロ   | 8mg                    |        | ↓↓↓      |    |        |     |      |                |     |     |      |     |      | ↓↓↓ |      |     |
| オランザピン | 5mg                    |        | ↓↓↓      |    |        |     |      |                |     |     |      |     |      | ↓↓↓ |      |     |
| 治療開始日  |                        |        |          |    |        |     |      |                |     |     |      |     |      |     |      |     |
| 身長     | 160                    | cm     | 体重       | 50 | kg     | BSA | 1.46 | m <sup>2</sup> |     |     |      |     |      |     |      |     |
| eGFR   | 60                     | ml/min | eGFR/BSA | 51 | ml/min |     |      |                |     |     |      |     |      |     |      |     |


## Day 1

## Day 2 3

| 投与開始基準   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・好中球&gt;1,500</li> <li>・Plt&gt;100,000</li> <li>・AST/ALT&lt;100, T-Bil&lt;1.8, Cr&lt;1.2 (CCr 60未満ではCDDP減量考慮)</li> <li>・肺毒性G1以下</li> <li>・G3以上の非血液毒性なし</li> </ul> |

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| 1) 生理食塩液 | 50ml  | 血管確保  |
| ↓        |       |       |
| 2) 生理食塩液 | 100ml |       |
| ハイカムチン   | 1.1mg | 30分   |
| ↓        |       |       |
| 3) 生理食塩液 | 50ml  | フラッシュ |

## 400ml/時



オランザピンは糖尿病の患者に禁忌  
 ★オランザピン5mg錠はday1の夕から  
 ★デカドロ錠はday2の朝から  
 ★イオン飲料水1000mlを3日間

## 化学療法計画書

|        |                       |          |           |      |     |                     |       |      |   |       |      |       |    |       |
|--------|-----------------------|----------|-----------|------|-----|---------------------|-------|------|---|-------|------|-------|----|-------|
| 治療法名   |                       | ノギテカン単剤  |           |      |     |                     |       |      |   |       |      |       |    |       |
| コース数   |                       | 1        |           | コース目 |     |                     |       |      |   |       |      |       |    |       |
| 腫瘍種    | 卵巣癌（がん化学療法後に増悪）       |          |           |      |     |                     |       |      |   |       |      |       |    |       |
| 患者名    |                       |          |           | ♀    | 年齢  |                     |       |      |   |       |      |       |    |       |
| 患者ID   |                       |          |           | 生年月日 |     |                     |       |      |   |       |      |       |    |       |
| 開始予定日  |                       |          |           | 部署   | 主治医 | 科                   | Dr    |      |   |       |      |       |    |       |
| 治療内容   | Day                   | 1        | 2         | 3    | 4   | 5                   | 6     | 7    | 8 | ..... | 15   | ..... | 22 | ..... |
|        | 予定日                   | 1/0      |           |      | 1/0 |                     |       | 1/14 |   |       | 1/21 |       |    |       |
| ハイカムチン | 1.5 mg/m <sup>2</sup> | ↓        | ↓         | ↓    | ↓   | ↓                   |       |      |   |       |      |       |    |       |
| デキサート  | 6.6mg                 | ↓        | ↓         | ↓    | ↓   | ↓                   |       |      |   |       |      |       |    |       |
| 治療開始日  |                       |          |           | 治療間隔 | 3週毎 | 予定コース数              | 6 コース |      |   |       |      |       |    |       |
| 身長     | 150 cm                | 体重       | 50 kg     |      | BSA | 1.40 m <sup>2</sup> |       |      |   |       |      |       |    |       |
| eGFR   | 60 ml/min             | eGFR/BSA | 49 ml/min |      |     |                     |       |      |   |       |      |       |    |       |

| ノギテカン投与量             |   |                            |
|----------------------|---|----------------------------|
| リスク因子なし              | ノギテカン初期投与量<br>強力な前治療がなくPS良好→1.25mg-1.5mg/m <sup>2</sup> /日  |                            |
| 広範な前治療<br>白金製剤による前治療 | 1.25mg/m <sup>2</sup> /日→更なるリスク因子あれば1.0mg/m <sup>2</sup> /日 |                            |
| 高齢者<br>放射線治療         | 1.0-1.25mg/m <sup>2</sup> /日                                |                            |
| 腎機能不全 (CCr)          | 最小限の前治療 : mg/m <sup>2</sup>                                 | 大量の前治療 : mg/m <sup>2</sup> |
| ≥60                  | 1.5   | 1.25                       |
| 40-59                | 1.25  | 1                          |
| 20-39                | 0.75  | 0.5                        |
| ≤20                  |   |                            |

|  |
|--|
| 初回投与開始基準   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 10000 ≥ WBC ≥ 3,000、好中球数 ≥ 2000</li> <li>・ Plt ≥ 100,000</li> <li>・ Hb ≥ 9.0</li> <li>・ AST/ALT ≤ ULN × 2.5</li> <li>・ T-Bil ≤ 1.5</li> <li>・ Cr ≤ 1.5</li> </ul> |
| 投与開始基準 (2回目以降)   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 好中球数 ≥ 1000</li> <li>・ Hb ≥ 9.0</li> <li>・ Plt ≥ 100,000</li> <li>・ 非血液毒性G2以下)</li> </ul>   |
| 減量基準   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ G4の好中球減少7日以上持続</li> <li>・ G-CSFを投与後感染又は発熱を伴う好中球減少 (500未満)</li> <li>・ G-CSFを投与して22日目以降もG3以上の好中球減少が持続</li> <li>・ G4の血小板減少 ・ FN</li> <li>・ G3-4の非血液毒性が発現</li> </ul>  |
| ⇒ 0.25mg/m <sup>2</sup> 減量<br>(腎機能正常最低用量1.0mg/m <sup>2</sup> /日)   |


| Day 1 ~ 5                      |       |
|--------------------------------|-------|
| 1) 生理食塩液 50ml<br>デキサート 6.6mg   | 30分   |
| ↓                              |       |
| 2) 生理食塩液 100ml<br>ハイカムチン 2.1mg | 30分   |
| ↓                              |       |
| 3) 生理食塩液 50ml                  | フラッシュ |

# 化学療法計画書

|         |                      |          |           |        |                     |      |
|---------|----------------------|----------|-----------|--------|---------------------|------|
| 治療法名    | ドキシル/カルボプラチン         |          |           |        |                     |      |
| コース数    | 1                    | コース目     |           |        |                     |      |
| 腫瘍種     | 卵巣がん                 |          |           |        |                     |      |
| 患者名     |                      | 性別       | 年齢        |        |                     |      |
| 患者ID    |                      | 生年月日     |           |        |                     |      |
| 部署      |                      | 主治医      | 科         | Dr     |                     |      |
| 開始予定日   |                      |          |           |        |                     |      |
| 治療内容    | Day                  | 1        | 8         | 15     | 22                  | 29   |
|         | 予定日                  | 1/0      |           |        |                     | 1/29 |
| カルボプラチン | 5 AUC                | ↓        |           |        |                     |      |
| ドキシル    | 30 mg/m <sup>2</sup> | ↓        |           |        |                     |      |
| アロキシ    | 0.75mg               | ↓        |           |        |                     |      |
| デキサート   | 6.6mg                | ↓        |           |        |                     |      |
| デカドロン   | 8mg                  | ↓↓↓      |           |        |                     |      |
| ピリドキサル  | 60mg                 |          |           |        |                     |      |
| 治療開始日   |                      | 治療間隔     | 4週毎       | 予定コース数 | PDになるまで             |      |
| 身長      | 150 cm               | 体重       | 50 kg     | BSA    | 1.40 m <sup>2</sup> |      |
| eGFR    | 50 ml/min            | eGFR/BSA | 40 ml/min |        |                     |      |

|  |
|--|
| <b>初回投与開始の基準</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ PS 2 以下 ・ 12000 ≥ WBC ≥ 3000</li> <li>・ 好中球 ≥ 1500</li> <li>・ Hb ≥ 9.0 ・ Plt ≥ 10万</li> <li>・ AST/ALT/ALP ≤ 2.5 × ULN</li> <li>・ T-Bil ≤ 1.2 × ULN</li> <li>(1.2~3.0 → 75%量に 3以上 → 50%量に)</li> <li>・ Cr ≤ 1.5 × ULN</li> <li>・ LVEF ; 50%以上 NYHA分類 1</li> </ul>                           |
| <b>2コース目以降の投与開始基準</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ WBC ≥ 3000 ・ 好中球 ≥ 1500</li> <li>・ Plt ≥ 10万</li> <li>・ AST/ALT ≤ 2.5 × ULN</li> <li>・ T-Bil ≤ 1.2</li> <li>(1.2~3.0 → 75%量に 3以上 → 50%量に)</li> <li>・ Cr ≤ 1.5</li> <li>・ 手足症候群、口内炎 G1 以下</li> <li>・ その他の副作用 G2 以下</li> </ul>  |
| <b>減量基準</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ G4の白血球数減少が5日以上持続</li> <li>・ G4の好中球減少が7日以上継続</li> <li>・ G4のPLT減少 ・ FN</li> <li>→ ドキシル 25mg/m<sup>2</sup> CBDCA : AUC4</li> <li>・ 手足症候群、口内炎 (G2 or G3 以上)</li> <li>→ G0-1 まで投与延期 ⇒ ドキシル 25mg/m<sup>2</sup> に</li> <li>・ その他の副作用</li> <li>→ G2 以下に回復すれば ドキシル 25mg/m<sup>2</sup> に</li> </ul> |
| <b>中止基準</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ LVEF 45% 以下またはベ-スラインより 20% 以上低下</li> <li>・ T-Bil が 3.0 以上のとき (ドキシルの影響が大)</li> <li>・ 手足症候群 ・ 口内炎</li> <li>→ 2週間延期しても G2 以下にならない</li> <li>・ その他の副作用</li> <li>→ 2週間延期しても G2 以下にならない</li> </ul>   |

|                     |
|---------------------|
| <b>心機能への注意</b>      |
| LVEF値は6コースを超えた時点で実施 |
| 8コースを超えた時点で毎コース実施   |



デカドロンはday2の朝から



# 化学療法計画書

|        |  |          |                               |
|--------|--|----------|-------------------------------|
| 治療法名   | ドキシル/アバスチン   |          |                               |
| コース数   | 1  | コース目     |                               |
| 腫瘍種    | 卵巣がん   |          |                               |
| 患者名    |  | ♀        | 年齢                            |
| 患者ID   | 生年月日   |          |                               |
| 開始予定日  |  | 部署       | 主治医 科 Dr                      |
| 治療内容   | Day 1 . . . . . 8 . . . . . 15 . . . . . 22 . . . . . 29 . . . . . |          |                               |
|        | 予定日 1/0  | 1/15     | 1/29                          |
| ドキシル   | 40 mg/m <sup>2</sup>   | ↓        |                               |
| アバスチン  | 10 mg/kg   | ↓        | ↓                             |
| デキサート  | 6.6mg  | ↓        |                               |
| ピリドキサル | 60mg   |          | →                             |
| 治療開始日  |  | 治療間隔     | 4週毎 予定コース数 PDになるまで            |
| 身長     | 150 cm   | 体重       | 50 kg BSA 1.60 m <sup>2</sup> |
| eGFR   | 50 ml/min  | eGFR/BSA | 46 ml/min                     |

## 初回投与開始の基準

- ・ PS 2 以下 ・ 12000 ≥ WBC ≥ 3000
- ・ 好中球 ≥ 1500
- ・ Hb ≥ 9.0 ・ Plt ≥ 10万
- ・ AST/ALT/ALP ≤ 2.5 × ULN
- ・ T-Bil ≤ 1.2 × ULN
- (1.2 ~ 3.0 → 75%量に 3以上 → 50%量に)
- ・ Cr ≤ 1.5 × ULN
- ・ LVEF ; 50%以上 NYHA分類 1

## 2コース目以降の投与開始基準

- ・ 好中球 ≥ 1500
- ・ Plt ≥ 7.5万
- ・ AST/ALT ≤ 2.5 × ULN
- ・ T-Bil ≤ 1.2
- (1.2 ~ 3.0 → 75%量に 3以上 → 50%量に)
- ・ Cr ≤ 1.5
- ・ 手足症候群、口内炎 G1 以下
- ・ その他の副作用 G2 以下

## ドキシル減量基準

- ・ G4の好中球数減少が7日以上持続
- ・ G4のPLT減少 → 25%減量
- ・ 手足症候群、口内炎 → G2以下に回復すれば25%減量で
- ・ その他の副作用 → G2以下に回復すれば25%減量で

## ドキシル中止基準

- ・ LVEF 45%以下またはβ-ラインより20%以上低下
- ・ T-Bilが3.0以上のとき (ドキシルの影響が大)
- ・ 手足症候群・口内炎 → 2週間延期してもG2以下にならない
- ・ その他の副作用 → 2週間延期してもG2以下にならない

## アバスチン休薬基準

1. 出血 Grade 2
2. 蛋白尿 Grade 2 : 100mg/dl 以下になるまで
3. 肝機能障害 Grade 3以上

## アバスチン中止基準

1. 過敏症 Grade 3以上
2. 消化管穿孔・裂開
3. 出血 Grade 3以上
4. 血栓症・塞栓症 Grade 3 (静脈系)
5. 血栓症・塞栓症 Grade 1 (動脈系)
6. 高血圧 Grade 3以上 (薬剤制御不可)
7. 蛋白尿 Grade 4
8. 中枢神経症状発現

## 心機能への注意

LVEF値は6コースを超えた時点で実施  
8コースを超えた時点で毎コース実施

## インラインフィルターを通さない Day 1

1) 生理食塩液 50ml  
デキサート 6.6mg 30分

2) 5%ブドウ糖 100ml

5%ブドウ糖を10ml早送りしたあと  
ドキシル開始。ドキシル投与中は5%ブドウ糖  
は止める

3) 5%ブドウ糖 500ml 2h  
ドキシル 64mg

★ドキシル終了後30分かけて5%ブドウ糖液落とす

## インフュージョンリアクション注意

4) 生理食塩液 100ml  
アバスチン 500mg 30分

5) 生理食塩液 50ml フラッシュ

## Day 15

1) 生理食塩液 50ml 血管確保


2) 生理食塩液 100ml  
アバスチン 500mg 30分

3) 生理食塩液 50ml フラッシュ

# 化学療法計画書

|        |                      |  |           |        |                     |
|--------|----------------------|--|-----------|--------|---------------------|
| 治療法名   | ドキシル単剤               |  |           |        |                     |
| コース数   | 1                    | コース目   |           |        |                     |
| 腫瘍種    | 卵巣がん                 |  |           |        |                     |
| 患者名    |                      | 性別   | ♀         | 年齢     |                     |
| 患者ID   | 生年月日                 |  |           |        |                     |
| 開始予定日  |                      | 部署   |           | 主治医    | 科 Dr                |
| 治療内容   | Day                  | 1 . . . . . 8 . . . . . 15 . . . . . 22 . . . . . 29 . . . . . |           |        |                     |
|        | 予定日                  | 1/1  | 1/29      |        |                     |
| ドキシル   | 50 mg/m <sup>2</sup> | ↓  |           |        |                     |
| デキサート  | 6.6mg                | ↓  |           |        |                     |
| ピドキサール | 60mg                 |  | →         |        |                     |
| 治療開始日  |                      | 治療間隔   | 4週毎       | 予定コース数 | PDになるまで             |
| 身長     | 150 cm               | 体重   | 50 kg     | BSA    | 1.60 m <sup>2</sup> |
| eGFR   | 60 ml/min            | eGFR/BSA   | 55 ml/min |        |                     |

|  |
|--|
| <b>初回投与開始の基準</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ PS 2 以下</li> <li>・ 12000 ≥ WBC ≥ 3000</li> <li>・ 好中球 ≥ 1500</li> <li>・ Hb ≥ 9.0</li> <li>・ Plt ≥ 10万</li> <li>・ AST/ALT/ALP ≤ 2.5 × ULN</li> <li>・ T-Bil ≤ 1.2 × ULN</li> <li>(1.2 ~ 3.0 → 75%量に 3以上 → 50%量に)</li> <li>・ Cr ≤ 1.5 × ULN</li> <li>・ LVEF ; 50%以上 NYHA分類 1</li> </ul> |
| <b>2コース目以降の投与開始基準</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 好中球 ≥ 1500</li> <li>・ Plt ≥ 7.5万</li> <li>・ AST/ALT ≤ 2.5 × ULN</li> <li>・ T-Bil ≤ 1.2</li> <li>(1.2 ~ 3.0 → 75%量に 3以上 → 50%量に)</li> <li>・ Cr ≤ 1.5</li> <li>・ 手足症候群、口内炎G1以下</li> <li>・ その他の副作用G2以下</li> </ul>  |
| <b>減量基準</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ G4の好中球数減少が7日以上持続</li> <li>・ G4のPLT減少</li> <li>→ 25%減量</li> <li>・ 手足症候群、口内炎</li> <li>→ G2以下に回復すれば25%減量で</li> <li>・ その他の副作用</li> <li>→ G2以下に回復すれば25%減量で</li> </ul>  |
| <b>中止基準</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ LVEF45%以下またはベ-スラインより20%以上低下</li> <li>・ T-Bilが3.0以上のとき (ドキシルの影響が大)</li> <li>・ 手足症候群・口内炎</li> <li>→ 2週間延期してもG2以下にならない</li> <li>・ その他の副作用</li> <li>→ 2週間延期してもG2以下にならない</li> </ul>  |




# 化学療法計画書

|         |                          |        |          |    |     |        |        |                |     |     |    |       |    |     |    |      |      |
|---------|--------------------------|--------|----------|----|-----|--------|--------|----------------|-----|-----|----|-------|----|-----|----|------|------|
| 治療法名    | イホマイド/シスプラチン             |        |          |    |     |        |        |                |     |     |    |       |    |     |    |      |      |
| コース数    | 1                        | コース目   |          |    |     |        |        |                |     |     |    |       |    |     |    |      |      |
| 腫瘍種     | 子宮平滑筋肉腫                  |        |          |    |     |        |        |                |     |     |    |       |    |     |    |      |      |
| 患者名     | 名前を入力                    |        | ♀        | 年齢 |     |        |        |                |     |     |    |       |    |     |    |      |      |
| 患者ID    | IDを入力                    |        | 生年月日     |    |     |        |        |                |     |     |    |       |    |     |    |      |      |
| 開始予定日   |                          |        |          |    |     |        |        |                |     |     |    |       |    |     |    |      |      |
| 部署      | 指示部署を入                   |        | 主治医      | 科  | Dr  |        |        |                |     |     |    |       |    |     |    |      |      |
| 治療内容    | Day                      | 1      | 2        | 3  | 4   | 5      | 6      | 7              | 8   | ... | 15 | ...   | 22 | ... | 29 | ...  |      |
|         | 予定日                      | 1/0    |          |    |     |        |        | 1/7            |     |     |    | 1/14  |    |     |    | 1/21 | 1/28 |
| シスプラチン  | 20 mg/m <sup>2</sup>     | ↓↓↓↓↓  |          |    |     |        |        |                |     |     |    | ↓↓↓↓↓ |    |     |    |      |      |
| イホマイド   | 1500 mg/m <sup>2</sup>   | ↓↓↓↓↓  |          |    |     |        |        |                |     |     |    | ↓↓↓↓↓ |    |     |    |      |      |
| グラニセトロン | 1mg                      | ↓↓↓↓↓  |          |    |     |        |        |                |     |     |    | ↓↓↓↓↓ |    |     |    |      |      |
| デキサート   | 6.6mg                    | ↓↓↓↓↓  |          |    |     |        |        |                |     |     |    | ↓↓↓↓↓ |    |     |    |      |      |
| ウロミテキサン | 300 mg/m <sup>2</sup> x3 | ↓↓↓↓↓  |          |    |     |        |        |                |     |     |    | ↓↓↓↓↓ |    |     |    |      |      |
| 治療開始日   |                          |        | 治療間隔     |    | 3週毎 |        | 予定コース数 |                | コース |     |    |       |    |     |    |      |      |
| 身長      | 150                      | cm     | 体重       | 50 | kg  | BSA    | 1.40   | m <sup>2</sup> |     |     |    |       |    |     |    |      |      |
| eGFR    | 70                       | ml/min | eGFR/BSA | 57 |     | ml/min |        |                |     |     |    |       |    |     |    |      |      |

Day1-4 8:30開始

|  |
|--|
| <b>投与開始基準</b><br>・ WBC ≥ 3000, Plt ≥ 100,000<br>・ AST/ALT ≤ ULN × 3 T-bil ≤ 1.5<br>・ Cr ≤ 1.5, CCr ≥ 50<br>( < 30でIFM75%量 )<br>・ Alb ≥ 3.0<br>・ G2以上の非血液毒性なし |
| <b>減量基準</b><br>・ WBC < 1,000, Plt < 25,000<br>・ 発熱性好中球減少<br>・ G3以上の肝毒性<br>→ イホマイド 20%減量  |



★5日間体重測定 (AMIに) → 1kg増えたら利尿剤考慮 (医師に相談)

# 化学療法計画書


|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 治療法名 | CAP   |      |       |
| コース数 | 1     | コース目 |       |
| 腫瘍種  | 子宮体がん |      |       |
| 患者名  |       | ♀    | 年齢 60 |
| 患者ID | 生年月日  |      |       |
| 部署   |       | 主治医  | Dr    |

開始予定日

|        |                       |          |               |           |                     |   |   |   |      |     |        |     |      |     |      |     |
|--------|-----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------|---|---|---|------|-----|--------|-----|------|-----|------|-----|
| 治療内容   | Day                   | 1        | 2             | 3         | 4                   | 5 | 6 | 7 | 8    | ... | 15     | ... | 22   | ... | 29   | 30  |
|        | 予定日                   | 1/0      |               |           |                     |   |   |   | 1/7  |     | 1/14   |     | 1/21 |     | 1/28 |     |
| ピノルビン  | 40 mg/m <sup>2</sup>  | ↓        |               |           |                     |   |   |   |      |     |        |     | ↓    |     |      |     |
| エンドキサン | 500 mg/m <sup>2</sup> | ↓        |               |           |                     |   |   |   |      |     |        |     | ↓    |     |      |     |
| シスプラチン | 50 mg/m <sup>2</sup>  | ↓        |               |           |                     |   |   |   |      |     |        |     | ↓    |     |      |     |
| アロキシ   | 0.75mg                | ↓        |               |           |                     |   |   |   |      |     |        |     | ↓    |     |      |     |
| デキサート  | 9.9mg                 | ↓        |               |           |                     |   |   |   |      |     |        |     | ↓    |     |      |     |
| プロイメンド | 150mg                 | ↓        | (抗がん剤開始 1時間前) |           |                     |   |   |   |      |     |        |     | ↓    |     |      |     |
| デカドロン  | 8mg                   |          | ↓             | ↓         | ↓                   |   |   |   |      |     |        |     | ↓    | ↓   | ↓    | ↓   |
| オランザピン | 5mg                   |          | ↓             | ↓         | ↓                   | ↓ |   |   |      |     |        |     | ↓    | ↓   | ↓    | ↓   |
| 治療開始日  |                       |          |               |           |                     |   |   |   | 治療間隔 | 3週毎 | 予定コース数 |     |      |     |      | コース |
| 身長     | 160 cm                | 体重       | 50 kg         | BSA       | 1.46 m <sup>2</sup> |   |   |   |      |     |        |     |      |     |      |     |
| eGFR   | 50 ml/min             | eGFR/BSA |               | 42 ml/min |                     |   |   |   |      |     |        |     |      |     |      |     |

## Day 1

|                                   |
|-----------------------------------|
| 投与開始基準                            |
| ・ WBC>3000 好中球>1500               |
| ・ Plt>100,000                     |
| ・ PS 0-2                          |
| ・ AST/ALT ≤ 100, T-Bil ≤ 1.5      |
| ・ Cr ≤ 1.2                        |
| ( * Ccr : 30-60 ⇒ CDDPは50-75%量に ) |
| ( * T-Bil ≥ 1.5 ⇒ ピノルビン減量考慮 )     |



|                     |
|---------------------|
| 減量基準                |
| 1. G4の白血球減少または好中球減少 |
| 2. 発熱性好中球減少         |
| 3. 血小板5万未満          |
| ⇒ピノルビン20%減量         |

**オランザピンは糖尿病の患者に禁忌**  
 ★オランザピン5mg錠はday 1の夕から  
 ★デカドロン錠はday2の朝から  
 ★イオン飲料水1000mlを3日間

\* ピノルビン総投与量の制限 : ≤ 950mg/m<sup>2</sup>



# 化学療法計画書

|      |               |      |      |
|------|---------------|------|------|
| 治療法名 | パクリタキセル/アバステン |      |      |
| コース数 |               | コース目 |      |
| 腫瘍種  | 乳がん 卵巣がん      |      |      |
| 患者名  |               | ♀    | 年齢   |
| 患者ID | 生年月日          |      |      |
| 部署   |               | 主治医  | 科 Dr |

開始予定日

|         |           |             |             |              |              |              |
|---------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 治療内容    | Day       | 1 . . . . . | 8 . . . . . | 15 . . . . . | 22 . . . . . | 29 . . . . . |
|         | 予定日       | 1/0         | 1/7         | 1/14         | 1/21         | 1/28         |
| アバステン   | 10 mg/kg  | ↓           |             | ↓            |              | ↓            |
| パクリタキセル | 80 mg/m2  | ↓           | ↓           | ↓            |              | ↓            |
| ガスター    | 1A        | ↓           | ↓           | ↓            |              | ↓            |
| デキサート   | 6.6mg     | ↓           | ↓           | ↓            |              | ↓            |
| レスタミン   | 5錠        | ↓           | ↓           | ↓            |              | ↓            |
| 治療開始日   |           |             | 治療間隔        | 4週毎          | 予定コース数       | コース          |
| 身長      | 150 cm    | 体重          | 50 kg       | BSA          | 1.40 m2      |              |
| eGFR    | 79 ml/min | eGFR/BSA    |             | 64 ml/min    |              |              |

## Day 1・15

インラインフィルターを使用

|   |
|---|
| <b>投与開始基準</b><br>・好中球>1,500<br>・Plt>100,000<br>・神経毒性G2以下<br>・他のG2以上の非血液毒性なし<br>・PS 0-2  |
| <b>減量基準</b><br>・FN ・G4の好中球減少5日継続<br>・Plt<40,000で出血・Plt<20,000<br>・AST>ULN×5、T-Bil:1.6~2.5<br>→PTXは65mg/m2に減量<br>・その他の非血液毒性G3以上→G1まで休薬 |

- 1) 生理食塩液 50ml
- ↓
- 2) 生理食塩液 100ml  
アバステン 500mg 30分
- ↓
- 3) 生理食塩液 50ml 15分  
ガスター 1A  
デキサート 6.6mg  
点滴中にレスタミン 5錠内服
- ↓
- 4) 生理食塩液 100ml 30分
- ↓
- 5) 5%ブドウ糖 250ml  
パクリタキセル 112mg 60分
- ↓
- 6) 生理食塩液 50ml フラッシュ

## Day 8

インラインフィルターを使用

|  |
|--|
| <b>投与可否の基準</b><br>・WBC>2,000かつ好中球>1,000<br>・Plt>75,000<br>・神経毒性G2以下<br>・他のG2以上の非血液毒性なし |
|--|

- 1) 生理食塩液 50ml 15分  
ガスター 1A  
デキサート 6.6mg  
点滴中にレスタミン 5錠内服
- ↓
- 2) 生理食塩液 100ml 30分
- ↓
- 3) 5%ブドウ糖 250ml  
パクリタキセル 112mg 60分
- ↓
- 4) 生理食塩液 50ml フラッシュ

|  |
|--|
| <b>アバステン休薬基準</b><br>1. 出血 Grade2<br>2. 蛋白尿 Grade3以上:100mg/dl以下になるまで<br>3. 肝機能障害 Grade3以上 |
|--|

|   |
|---|
| <b>アバステン中止基準</b><br>1. 過敏症 Grade3以上<br>2. 消化管穿孔・裂開<br>3. 出血 Grade3以上<br>4. 血栓症・塞栓症 Grade3(静脈系)<br>5. 血栓症・塞栓症 Grade2(動脈系)<br>6. 高血圧 Grade3以上(薬剤制御不可)<br>7. 蛋白尿 Grade4<br>8. 中枢神経症状発現 |
|---|

アルコールに弱い人・お酒を飲めない人への投与時、注意  
 パクリタキセル投与中は、アレルギー症状の出現を厳重にチェック

# 化学療法計画書

|      |                      |      |    |    |
|------|----------------------|------|----|----|
| 治療法名 | パクリタキセル80mg/m2毎週     |      |    |    |
| コース数 |                      | コース目 |    |    |
| 腫瘍種  | 非小細胞肺癌、乳がん、胃がん、婦人科がん |      |    |    |
| 患者名  |                      | ♂    | 年齢 |    |
| 患者ID |                      | 生年月日 |    |    |
| 部署   |                      | 主治医  | 科  | Dr |

開始予定日

|         |           |          |           |      |         |      |
|---------|-----------|----------|-----------|------|---------|------|
| 治療内容    | Day       | 1        | 8         | 15   | 22      | 29   |
|         | 予定日       | 1/0      | 1/7       | 1/14 | 1/21    | 1/28 |
| パクリタキセル | 80 mg/m2  | ↓        | ↓         | ↓    |         | ↓    |
| デキサート   | 6.6mg     | ↓        | ↓         | ↓    |         | ↓    |
| ガスター    | 1A        | ↓        | ↓         | ↓    |         | ↓    |
| レスタミン   | 5錠        | ↓        | ↓         | ↓    |         | ↓    |
| 治療開始日   |           |          | 治療間隔      | 4週毎  | 予定コース数  | コース  |
| 身長      | 150 cm    | 体重       | 50 kg     | BSA  | 1.40 m2 |      |
| eGFR    | 50 ml/min | eGFR/BSA | 40 ml/min |      |         |      |

## Day 1

## Day 8 & 15

インラインフィルターを使用

インラインフィルターを使用

|                    |
|--------------------|
| <b>投与開始基準</b>      |
| ・WBC>3000 好中球>2000 |
| ・Plt>75000         |
| ・神経毒性G2以下          |
| ・他のG2以上の非血液毒性なし    |
| ・PS 0-2            |
| <b>減量基準</b>        |
| ・特になし              |

|                    |
|--------------------|
| <b>投与可否の基準</b>     |
| ・WBC>2000 好中球>1000 |
| ・Plt>50000         |
| ・神経毒性G2以下          |
| ・他のG2以上の非血液毒性なし    |
| <b>減量基準</b>        |
| ・特になし              |

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| 1) 生理食塩液       | 50ml  | 15分   |
| ガスター           | 1A    |       |
| デキサート          | 6.6mg |       |
| 点滴中にレスタミン 5錠内服 |       |       |
| ↓              |       |       |
| 2) 生理食塩液       | 100ml | 30分   |
| ↓              |       |       |
| 3) 5%ブドウ糖      | 250ml | 60分   |
| パクリタキセル        | 112mg |       |
| ↓              |       |       |
| 4) 生理食塩液       | 50ml  | フラッシュ |

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| 1) 生理食塩液       | 50ml  | 15分   |
| ガスター           | 1A    |       |
| デキサート          | 6.6mg |       |
| 点滴中にレスタミン 5錠内服 |       |       |
| ↓              |       |       |
| 2) 生理食塩液       | 100ml | 30分   |
| ↓              |       |       |
| 3) 5%ブドウ糖      | 250ml | 60分   |
| パクリタキセル        | 112mg |       |
| ↓              |       |       |
| 4) 生理食塩液       | 50ml  | フラッシュ |

パクリタキセル投与中は、アレルギー症状の出現を厳重にチェック  
アルコールに弱い人・お酒を飲めない人への投与時、注意


# 化学療法計画書

|         |                      |        |               |    |    |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
|---------|----------------------|--------|---------------|----|----|--------|------|---|----------------|-----|--------|-------|------|-----|------|-----|
| 治療法名    | IRI/CDDP             |        |               |    |    |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
| コース数    |                      | コース目   |               |    |    |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
| 腫瘍種     | 卵巣がん 肺がん             |        |               |    |    |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
| 患者名     |                      | ♀      | 年齢            |    |    |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
| 患者ID    | 生年月日                 |        |               |    |    |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
| 部署      |                      | 主治医    | 科             | Dr |    |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
| 開始予定日   |                      |        |               |    |    |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
| 治療内容    | Day                  | 1      | 2             | 3  | 4  | 5      | 6    | 7 | 8              | ... | 15     | ...   | 22   | ... | 29   | ... |
|         | 予定日                  | 1/0    |               |    |    |        |      |   | 1/7            |     | 1/14   |       | 1/21 |     | 1/28 |     |
| イリノテカン  | 60 mg/m <sup>2</sup> | ↓      |               |    |    |        |      |   | ↓              |     | ↓      |       | ↓    |     | ↓    |     |
| シスプラチン  | 60 mg/m <sup>2</sup> | ↓      |               |    |    |        |      |   |                |     |        |       | ↓    |     |      |     |
| アロキシ    | 0.75mg               | ↓      |               |    |    |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
| グラニセトロン | 1mg                  |        |               |    |    |        |      |   | ↓              |     | ↓      |       |      |     |      |     |
| デキサート   | 9.9mg                | ↓      |               |    |    |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
| デキサート   | 6.6mg                |        |               |    |    |        |      |   | ↓              |     | ↓      |       |      |     |      |     |
| プロイメンド  | 150mg                | ↓      | (抗がん剤開始 1時間前) |    |    |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
| デカドロン   | 8mg                  |        | ↓             | ↓  | ↓  |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
| オランザピン  | 5mg                  | ↓      | ↓             | ↓  | ↓  |        |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |
| 治療開始日   |                      |        |               |    |    |        |      |   | 治療間隔           | 3週毎 | 予定コース数 | 4 コース |      |     |      |     |
| 身長      | 150                  | cm     | 体重            | 50 | kg | BSA    | 1.40 |   | m <sup>2</sup> |     |        |       |      |     |      |     |
| eGFR    | 60                   | ml/min | eGFR/BSA      | 49 |    | ml/min |      |   |                |     |        |       |      |     |      |     |

## Day 1

| 投与開始基準   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・WBC&gt;3,000, かつ好中球&gt;2,000</li> <li>・Plt&gt;100,000</li> <li>・下痢なし</li> <li>・PS 0-2</li> <li>・AST/ALT≤100, T. Bil≤1.5</li> <li>・Cr≤1.2 ・Ccr≥50</li> <li>・T-Bil≥2.1禁忌or (減量考慮50%量)</li> </ul> |

## メイン400ml/hで投与



## Day 8、15

| 投与可否の基準   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・WBC&gt;3,000</li> <li>・Plt&gt;100,000</li> <li>・下痢なし</li> </ul> |



### オランザピンは糖尿病の患者に禁忌

- ★オランザピン5mgはday1の夕から
- ★デカドロンはday2の朝から
- ★体重1kg増加⇒医師に報告(利尿剤の考慮)
- ★day1からの飲水指導(イオン飲料1Lを目安、イオン飲料不得手であれば他の水分可)



# 化学療法計画書




|      |              |      |      |
|------|--------------|------|------|
| 治療法名 | PTX/CDDP/IFX |      |      |
| コース数 | 1            | コース目 |      |
| 腫瘍種  | 子宮頸癌         |      |      |
| 患者名  |              | ♀    | 年齢   |
| 患者ID |              | 生年月日 |      |
| 部署   |              | 主治医  | 科 Dr |

開始予定日

| 治療内容     | Day                      | 1        | 2         | 3 | 4    | 5                   | 6 | 7   | 8      | ... | 15   | ... | 22   | ... | 29   |
|----------|--------------------------|----------|-----------|---|------|---------------------|---|-----|--------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 予定日      |                          | 1/0      |           |   |      |                     |   |     | 1/7    |     | 1/14 |     | 1/21 |     | 1/28 |
| パクリタキセル  | 175 mg/m <sup>2</sup>    | ↓        |           |   |      |                     |   |     |        |     |      |     |      |     | ↓    |
| シスプラチン   | 75 mg/m <sup>2</sup>     |          | ↓         |   |      |                     |   |     |        |     |      |     |      |     | ↓    |
| イホマイド    | 1500 mg/m <sup>2</sup>   | ↓        | ↓         | ↓ |      |                     |   |     |        |     |      |     |      |     | ↓    |
| グラニセトロン  | 1mg                      | ↓        | ↓         | ↓ |      |                     |   |     |        |     |      |     |      |     |      |
| デキサート    | 19.8mg                   | ↓        |           |   |      |                     |   |     |        |     |      |     |      |     |      |
| デキサート    | 9.9mg                    |          | ↓         | ↓ |      |                     |   |     |        |     |      |     |      |     |      |
| ガスター     | 1A                       |          | ↓         |   |      |                     |   |     |        |     |      |     |      |     |      |
| プロイメンド   | 150mg                    |          | ↓         |   |      |                     |   |     |        |     |      |     |      |     |      |
| デカドロン    | 8mg                      |          |           |   | ↓    | ↓                   | ↓ |     |        |     |      |     |      |     |      |
| レスタミン    | 5錠                       |          | ↓         |   |      |                     |   |     |        |     |      |     |      |     |      |
| オランザピン   | 5mg                      |          | ↓         | ↓ | ↓    | ↓                   |   |     |        |     |      |     |      |     |      |
| ウロミテキサン  | 300 mg/m <sup>2</sup> ×3 | ↓        | ↓         | ↓ |      |                     |   |     |        |     |      |     |      |     |      |
| フィルグラスチム | 75 mcg                   |          |           |   |      |                     |   | ↓   | ↓      | ↓   | ↓    |     |      |     |      |
| 治療開始日    |                          |          |           |   | 治療間隔 |                     |   | 4週毎 | 予定コース数 | コース |      |     |      |     |      |
| 身長       | 150 cm                   | 体重       | 50 kg     |   | BSA  | 1.40 m <sup>2</sup> |   |     |        |     |      |     |      |     |      |
| eGFR     | 60 ml/min                | eGFR/BSA | 49 ml/min |   |      |                     |   |     |        |     |      |     |      |     |      |

|  |
|--|
| <b>投与開始基準</b>                              |
| ・ WBC>3000, 好中球>1,500, Plt>100,000         |
| ・ AST/ALT<100, T.bil<1.5                   |
| ・ Cr<1.2, CCr>60                           |
| ・ G2以上の非血液毒性なし                             |
| <b>減量基準</b>                                |
| ・ WBC<1,000, Plt<25,000                    |
| ・ 発熱性好中球減少                                 |
| ・ G3の非血液毒性<br>→PTX 150, CDDP 60, IFX 1200へ |
| ・ Cr>1.5 →CDDP中止                           |
| ・ Cr 1.2-1.5 →CDDP 60                      |
| ・ G2以上の末梢神経障害, 筋肉痛, 関節痛 →PTX 150へ          |

**インラインフィルターを使用**



**オランザピンは糖尿病の患者に禁忌**

- ★オランザピン5mgはday2の夕から
- ★デカドロンday4の朝から

# 化学療法計画書

|         |  |                      |  |          |  |           |   |        |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |      |  |
|---------|--|----------------------|--|----------|--|-----------|---|--------|----|---------------------|--|----|--|---|--|---|--|---|--|-----|--|------|--|-----|--|----|--|-----|--|------|--|------|--|
| 治療法名    |  | DOC/ CDDP            |  |          |  |           |   |        |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |      |  |
| コース数    |  | 1                    |  | コース目     |  |           |   |        |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |      |  |
| 腫瘍種     |  | 非小細胞肺がん              |  |          |  |           |   |        |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |      |  |
| 患者名     |  |                      |  |          |  |           | ♂ |        | 年齢 |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |      |  |
| 開始予定日   |  | 患者ID                 |  | 生年月日     |  |           |   |        |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |      |  |
|         |  | 部署                   |  | 主治医      |  |           |   |        |    |                     |  | Dr |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |      |  |
| 治療内容    |  | Day                  |  | 1        |  | 2         |   | 3      |    | 4                   |  | 5  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | ... |  | 15   |  | ... |  | 22 |  | ... |  | 29   |  | ...  |  |
|         |  | 予定日                  |  | 1/0      |  |           |   |        |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  | 1/14 |  |     |  |    |  |     |  | 1/21 |  | 1/28 |  |
| ドセタキセル  |  | 60 mg/m <sup>2</sup> |  | ↓        |  |           |   |        |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  | ↓    |  |      |  |
| カルボプラチン |  | 6 AUC                |  | ↓        |  |           |   |        |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  | ↓    |  |      |  |
| アロキシ    |  | 0.75mg               |  | ↓        |  |           |   |        |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |      |  |
| デキサート注  |  | 6.6mg                |  | ↓        |  |           |   |        |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |      |  |
| デカドロン錠  |  | 8mg                  |  | ↓↓↓      |  |           |   |        |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |      |  |
| 治療開始日   |  |                      |  | 治療間隔     |  | 3週毎       |   | 予定コース数 |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  | コース  |  |      |  |
| 身長      |  | 165.3 cm             |  | 体重       |  | 57.6 kg   |   | BSA    |    | 1.59 m <sup>2</sup> |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |      |  |
| eGFR    |  | 80 ml/min            |  | eGFR/BSA |  | 74 ml/min |   |        |    |                     |  |    |  |   |  |   |  |   |  |     |  |      |  |     |  |    |  |     |  |      |  |      |  |

|   |  |
|---|--|
| 投与開始基準  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>WBC&gt;3,000, かつ好中球&gt;2,000</li> <li>Plt&gt;100,000</li> <li>GOT/GPT&lt;100<br/>(GOT/GPT&gt;1.5xULNかつALP&gt;2.5xULN, またはT. Bil&gt;1.2) →DOC減量考慮</li> <li>G2以上の非血液毒性なし<br/>→満たさなければ1~2週延期</li> </ul> |  |
| 減量基準  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>WBC&lt;1000</li> <li>好中球&lt;500が4日以上持続</li> <li>発熱性好中球減少<br/>→DOC 50へ</li> <li>Plts&lt;20,000<br/>→CBDCA AUC 1減</li> <li>持続するG2以上の神経毒性</li> <li>コントロール不能の浮腫・胸水<br/>→中止</li> </ul>                    |  |

## Day 1

- 1) デキサート 6.6mg  
アロキシ 0.75mg 30分
- ↓
- 2) 5%ブドウ糖 250ml  
ドセタキセル 95mg 60分  
\* 投与開始時まず5ml早送りし,  
10分間は50ml/hで厳重に観察  
問題なければ250ml/hへ
- ↓
- 3) 5%ブドウ糖 250ml  
カルボプラチン 590mg 60分
- ↓
- 4) 生理食塩液 50ml フラッシュ

デカドロンはday 2 朝から

# 化学療法計画書

|      |                                 |      |    |    |
|------|---------------------------------|------|----|----|
| 治療法名 | ゲムシタビン                          |      |    |    |
| コース数 |                                 | コース目 |    |    |
| 腫瘍種  | 非小細胞肺癌、膵がん、胆道がん、<br>卵巣がん、尿路上皮がん |      |    |    |
| 患者名  |                                 | ♂    | 年齢 |    |
| 患者ID | 生年月日                            |      |    |    |
| 部署   |                                 | 主治医  | 科  | Dr |

開始予定日

|        |                        |          |           |     |                     |        |   |   |     |       |      |       |      |       |      |
|--------|------------------------|----------|-----------|-----|---------------------|--------|---|---|-----|-------|------|-------|------|-------|------|
| 治療内容   | Day                    | 1        | 2         | 3   | 4                   | 5      | 6 | 7 | 8   | ..... | 15   | ..... | 22   | ..... | 29   |
|        | 予定日                    | 1/0      |           |     |                     |        |   |   | 1/7 |       | 1/14 |       | 1/21 |       | 1/28 |
| ゲムシタビン | 1000 mg/m <sup>2</sup> | ↓        |           |     |                     |        |   |   | ↓   |       | ↓    |       |      |       | ↓    |
| デキサート  | 6.6mg                  | ↓        |           |     |                     |        |   |   | ↓   |       | ↓    |       |      |       | ↓    |
| 治療開始日  |                        | 治療間隔     |           |     |                     | 予定コース数 |   |   | コース |       |      |       |      |       |      |
| 身長     | 150 cm                 | 体重       | 50 kg     | BSA | 1.40 m <sup>2</sup> |        |   |   |     |       |      |       |      |       |      |
| eGFR   | 50 ml/min              | eGFR/BSA | 40 ml/min |     |                     |        |   |   |     |       |      |       |      |       |      |

## Day 1

|   |
|---|
| <b>投与開始基準</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ WBC&gt;3000かつNeu&gt;1500</li> <li>・ Plt&gt;10万</li> <li>・ AST/ALT&lt;100</li> <li>・ PS 0-2</li> <li>・ G2以上の非血液毒性がない</li> </ul>           |
| <b>減量基準</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ G4の白血球/血小板減少</li> <li>・ 発熱を伴うG3以上の好中球減少<br/>→いずれかで800mg/m<sup>2</sup>に減量</li> <li>・ G2以上の非血液毒性<br/>→800mg/m<sup>2</sup>に減量を考慮</li> </ul> |

|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| 1) 生理食塩液 | 50ml  | 30分 |
| デキサート    | 6.6mg |     |

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| 2) 生理食塩液 | 100ml  | 30分 |
| ゲムシタビン   | 1400mg |     |

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| 3) 生理食塩液 | 50ml | 30分 |
|----------|------|-----|

## Day 8 & 15

|   |
|---|
| <b>投与可否の基準</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ WBC&gt;2000</li> <li>・ Plt&gt;70000</li> <li>・ AST/ALT&lt;100</li> </ul> |

|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| 1) 生理食塩液 | 50ml  | 30分 |
| デキサート    | 6.6mg |     |

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| 2) 生理食塩液 | 100ml  | 30分 |
| ゲムシタビン   | 1400mg |     |

|          |      |       |
|----------|------|-------|
| 3) 生理食塩液 | 50ml | フラッシュ |
|----------|------|-------|